

表 3275 透析前アルブミン濃度(g/dL) Non-HDL-C濃度(mg/dL)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回)

Non-HDL-C濃度	1.5未満	1.5～	2.0～	2.5～	3.0～	3.5～	4.0～	4.5～	5.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
50未満 (%)		5 (0.9)	21 (4.0)	51 (9.7)	137 (26.0)	236 (44.8)	72 (13.7)	4 (0.8)	1 (0.2)	527 (100.0)	2	529	3.47	0.52
50～ (%)	1 (0.0)	14 (0.6)	40 (1.7)	135 (5.7)	632 (26.5)	1,174 (49.2)	368 (15.4)	19 (0.8)	2 (0.1)	2,385 (100.0)	18	2,403	3.56	0.44
70～ (%)		8 (0.2)	57 (1.1)	231 (4.5)	1,343 (26.3)	2,590 (50.7)	853 (16.7)	26 (0.5)	1 (0.0)	5,109 (100.0)	29	5,138	3.59	0.40
90～ (%)		5 (0.1)	35 (0.6)	191 (3.1)	1,440 (23.1)	3,338 (53.6)	1,156 (18.6)	63 (1.0)	3 (0.0)	6,231 (100.0)	34	6,265	3.65	0.38
110～ (%)	3 (0.1)	2 (0.0)	15 (0.3)	142 (2.8)	1,115 (21.7)	2,814 (54.9)	1,004 (19.6)	32 (0.6)	2 (0.0)	5,129 (100.0)	33	5,162	3.66	0.36
130～ (%)			8 (0.3)	72 (2.3)	618 (19.7)	1,763 (56.3)	632 (20.2)	35 (1.1)	3 (0.1)	3,131 (100.0)	18	3,149	3.69	0.35
150～ (%)			7 (0.4)	34 (2.1)	303 (19.1)	880 (55.5)	354 (22.3)	7 (0.4)	2 (0.1)	1,587 (100.0)	10	1,597	3.70	0.35
170～ (%)		2 (0.3)	2 (0.3)	9 (1.3)	132 (19.5)	367 (54.1)	156 (23.0)	10 (1.5)		678 (100.0)	4	682	3.71	0.36
190～ (%)			2 (0.8)	8 (3.1)	53 (20.3)	135 (51.7)	59 (22.6)	4 (1.5)		261 (100.0)	1	262	3.70	0.38
210～ (%)				3 (2.2)	33 (23.7)	64 (46.0)	36 (25.9)	3 (2.2)		139 (100.0)	2	141	3.72	0.38
合計 (%)	4 (0.0)	36 (0.1)	187 (0.7)	876 (3.5)	5,806 (23.1)	13,361 (53.1)	4,690 (18.6)	203 (0.8)	14 (0.1)	25,177 (100.0)	151	25,328	3.64	0.39
記載なし (%)	6 (0.0)	26 (0.2)	107 (0.8)	516 (3.8)	3,001 (22.3)	7,224 (53.6)	2,468 (18.3)	114 (0.8)	4 (0.0)	13,466 (100.0)	1,152	14,618	3.63	0.39
総計 (%)	10 (0.0)	62 (0.2)	294 (0.8)	1,392 (3.6)	8,807 (22.8)	20,585 (53.3)	7,158 (18.5)	317 (0.8)	18 (0.0)	38,643 (100.0)	1,303	39,946	3.64	0.39
平均	101.75	75.44	85.84	95.99	103.78	108.23	111.00	112.46	110.14	107.12	107.46	107.12		
標準偏差	28.55	32.25	32.17	33.08	33.11	32.83	33.90	37.70	37.71	33.37	34.13	33.37		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査