

表 3276 透析前アルブミン濃度(g/dL) 透析前収縮期血圧(mmHg)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

透析前収縮 期血圧	1.5未満	1.5～	2.0～	2.5～	3.0～	3.5～	4.0～	4.5～	5.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
60未満 (%)					1 (50.0)	1 (50.0)				2 (100.0)		2	3.60	0.42
60～ (%)		2 (1.8)	8 (7.1)	12 (10.6)	45 (39.8)	40 (35.4)	6 (5.3)			113 (100.0)	2	115	3.28	0.52
80～ (%)		3 (0.5)	23 (3.8)	59 (9.8)	189 (31.4)	270 (44.9)	57 (9.5)	1 (0.2)		602 (100.0)	13	615	3.43	0.47
100～ (%)	2 (0.1)	13 (0.5)	52 (1.9)	190 (6.9)	846 (30.6)	1,323 (47.9)	323 (11.7)	13 (0.5)	1 (0.0)	2,763 (100.0)	37	2,800	3.50	0.44
120～ (%)	2 (0.0)	15 (0.2)	59 (0.8)	296 (3.9)	1,872 (24.9)	3,932 (52.2)	1,294 (17.2)	54 (0.7)	7 (0.1)	7,531 (100.0)	108	7,639	3.61	0.39
140～ (%)		12 (0.1)	68 (0.6)	341 (3.0)	2,465 (21.8)	6,174 (54.7)	2,124 (18.8)	95 (0.8)	5 (0.0)	11,284 (100.0)	149	11,433	3.65	0.37
160～ (%)	3 (0.0)	7 (0.1)	39 (0.5)	227 (2.8)	1,636 (19.9)	4,487 (54.7)	1,726 (21.0)	77 (0.9)	4 (0.0)	8,206 (100.0)	102	8,308	3.68	0.37
180～ (%)	1 (0.0)	2 (0.1)	18 (0.6)	80 (2.6)	617 (19.7)	1,683 (53.8)	697 (22.3)	32 (1.0)		3,130 (100.0)	24	3,154	3.69	0.37
200～ (%)		1 (0.1)	3 (0.4)	25 (3.1)	170 (20.8)	421 (51.6)	185 (22.7)	11 (1.3)		816 (100.0)	6	822	3.69	0.37
220～ (%)		1 (0.5)	2 (0.9)	4 (1.9)	39 (18.1)	122 (56.7)	46 (21.4)	1 (0.5)		215 (100.0)	1	216	3.69	0.38
合計 (%)	8 (0.0)	56 (0.2)	272 (0.8)	1,234 (3.6)	7,880 (22.7)	18,453 (53.2)	6,458 (18.6)	284 (0.8)	17 (0.0)	34,662 (100.0)	442	35,104	3.64	0.39
記載なし (%)	2 (0.1)	6 (0.2)	22 (0.6)	158 (4.0)	927 (23.3)	2,132 (53.6)	700 (17.6)	33 (0.8)	1 (0.0)	3,981 (100.0)	861	4,842	3.63	0.39
総計 (%)	10 (0.0)	62 (0.2)	294 (0.8)	1,392 (3.6)	8,807 (22.8)	20,585 (53.3)	7,158 (18.5)	317 (0.8)	18 (0.0)	38,643 (100.0)	1,303	39,946	3.64	0.39
平均	149.63	135.89	136.71	142.41	147.28	151.54	154.66	156.17	141.53	150.72	146.61	150.67		
標準偏差	30.97	31.65	30.79	27.50	25.85	24.48	23.77	23.32	17.55	25.05	24.13	25.04		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査