

表 3277 透析前アルブミン濃度(g/dL) 透析前拡張期血圧(mmHg)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

透析前拡張期血圧	1.5未満	1.5～	2.0～	2.5～	3.0～	3.5～	4.0～	4.5～	5.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)					1 (16.7)	5 (83.3)				6 (100.0)	1	7	3.75	0.20
20～ (%)		1 (0.9)	5 (4.3)	16 (13.7)	45 (38.5)	42 (35.9)	7 (6.0)	1 (0.9)		117 (100.0)	4	121	3.34	0.45
40～ (%)	2 (0.1)	13 (0.5)	57 (2.2)	196 (7.4)	895 (33.9)	1,211 (45.9)	258 (9.8)	4 (0.2)	3 (0.1)	2,639 (100.0)	41	2,680	3.46	0.44
60～ (%)	2 (0.0)	29 (0.2)	133 (0.9)	629 (4.3)	3,769 (25.5)	7,828 (53.0)	2,282 (15.5)	83 (0.6)	8 (0.1)	14,763 (100.0)	209	14,972	3.60	0.39
80～ (%)	2 (0.0)	8 (0.1)	53 (0.6)	240 (2.7)	1,796 (20.2)	4,889 (54.9)	1,817 (20.4)	91 (1.0)	4 (0.0)	8,900 (100.0)	103	9,003	3.67	0.37
90～ (%)	2 (0.0)	3 (0.1)	16 (0.3)	107 (2.0)	908 (17.3)	2,913 (55.3)	1,257 (23.9)	55 (1.0)	2 (0.0)	5,263 (100.0)	54	5,317	3.72	0.36
100～ (%)		2 (0.1)	6 (0.2)	41 (1.5)	393 (14.7)	1,413 (52.8)	775 (29.0)	44 (1.6)		2,674 (100.0)	27	2,701	3.77	0.35
120～ (%)			1 (0.6)	1 (0.6)	27 (16.2)	77 (46.1)	55 (32.9)	6 (3.6)		167 (100.0)	2	169	3.81	0.37
140～ (%)					5 (41.7)	6 (50.0)	1 (8.3)			12 (100.0)		12	3.62	0.28
合計 (%)	8 (0.0)	56 (0.2)	271 (0.8)	1,230 (3.6)	7,839 (22.7)	18,384 (53.2)	6,452 (18.7)	284 (0.8)	17 (0.0)	34,541 (100.0)	441	34,982	3.64	0.39
記載なし (%)	2 (0.0)	6 (0.1)	23 (0.6)	162 (3.9)	968 (23.6)	2,201 (53.7)	706 (17.2)	33 (0.8)	1 (0.0)	4,102 (100.0)	862	4,964	3.63	0.38
総計 (%)	10 (0.0)	62 (0.2)	294 (0.8)	1,392 (3.6)	8,807 (22.8)	20,585 (53.3)	7,158 (18.5)	317 (0.8)	18 (0.0)	38,643 (100.0)	1,303	39,946	3.64	0.39
平均	75.75	70.04	69.68	72.63	75.89	79.68	83.32	86.11	74.53	79.21	76.51	79.17		
標準偏差	16.67	15.51	15.17	14.69	14.63	14.28	14.31	14.43	13.17	14.69	15.58	14.70		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査