

表 3278 透析前アルブミン濃度(g/dL) 透析前脈拍(拍/分)別(血液透析濾過患者 透析回数週3回)

透析前脈拍	1.5未満	1.5～	2.0～	2.5～	3.0～	3.5～	4.0～	4.5～	5.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
40未満 (%)				1 (5.9)	4 (23.5)	9 (52.9)	3 (17.6)			17 (100.0)		17	3.51	0.39
40～ (%)			4 (1.4)	12 (4.1)	88 (30.3)	150 (51.7)	35 (12.1)	1 (0.3)		290 (100.0)	5	295	3.55	0.37
50～ (%)		1 (0.0)	13 (0.5)	113 (4.3)	751 (28.9)	1,371 (52.8)	327 (12.6)	19 (0.7)	3 (0.1)	2,598 (100.0)	34	2,632	3.58	0.37
60～ (%)		12 (0.1)	61 (0.7)	276 (3.3)	2,117 (25.2)	4,473 (53.3)	1,411 (16.8)	40 (0.5)	2 (0.0)	8,392 (100.0)	98	8,490	3.61	0.37
70～ (%)	3 (0.0)	16 (0.2)	75 (0.7)	352 (3.4)	2,355 (22.6)	5,663 (54.2)	1,881 (18.0)	93 (0.9)	3 (0.0)	10,441 (100.0)	104	10,545	3.64	0.38
80～ (%)	2 (0.0)	13 (0.2)	51 (0.7)	257 (3.7)	1,423 (20.4)	3,721 (53.4)	1,448 (20.8)	54 (0.8)	3 (0.0)	6,972 (100.0)	91	7,063	3.66	0.39
90～ (%)		8 (0.2)	42 (1.3)	128 (3.9)	613 (18.8)	1,691 (51.9)	733 (22.5)	41 (1.3)	3 (0.1)	3,259 (100.0)	34	3,293	3.67	0.42
100～ (%)	3 (0.3)	3 (0.3)	11 (1.1)	50 (4.9)	212 (20.6)	514 (49.9)	218 (21.2)	18 (1.7)	1 (0.1)	1,030 (100.0)	12	1,042	3.65	0.45
110～ (%)		1 (0.4)	4 (1.5)	11 (4.2)	60 (23.0)	120 (46.0)	59 (22.6)	6 (2.3)		261 (100.0)		261	3.64	0.45
120～ (%)		2 (1.9)	1 (1.0)	3 (2.9)	20 (19.0)	53 (50.5)	26 (24.8)			105 (100.0)	1	106	3.64	0.47
合計 (%)	8 (0.0)	56 (0.2)	262 (0.8)	1,203 (3.6)	7,643 (22.9)	17,765 (53.2)	6,141 (18.4)	272 (0.8)	15 (0.0)	33,365 (100.0)	379	33,744	3.63	0.39
記載なし (%)	2 (0.0)	6 (0.1)	32 (0.6)	189 (3.6)	1,164 (22.1)	2,820 (53.4)	1,017 (19.3)	45 (0.9)	3 (0.1)	5,278 (100.0)	924	6,202	3.65	0.38
総計 (%)	10 (0.0)	62 (0.2)	294 (0.8)	1,392 (3.6)	8,807 (22.8)	20,585 (53.3)	7,158 (18.5)	317 (0.8)	18 (0.0)	38,643 (100.0)	1,303	39,946	3.64	0.39
平均	88.25	80.48	77.84	75.83	73.97	75.31	77.21	79.15	77.00	75.44	74.66	75.43		
標準偏差	14.08	15.81	14.25	13.67	12.93	12.75	12.93	13.71	16.82	12.93	12.80	12.93		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査