

表 3281 アルブミン濃度(g/dL) 透析歴(年)別 (腹膜透析患者)

透析歴	1.5未満	1.5～	2.0～	2.5～	3.0～	3.5～	4.0～	4.5～	5.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
2年未満 (%)	7 (0.3)	34 (1.4)	145 (6.0)	438 (18.3)	796 (33.2)	771 (32.2)	194 (8.1)	12 (0.5)		2,397 (100.0)	1,203	3,600	3.26	0.55
2年～ (%)	3 (0.1)	24 (1.2)	94 (4.5)	335 (16.2)	788 (38.0)	668 (32.2)	152 (7.3)	7 (0.3)	1 (0.0)	2,072 (100.0)	1,129	3,201	3.29	0.50
5年～ (%)	2 (0.2)	13 (1.1)	45 (4.0)	196 (17.3)	447 (39.4)	358 (31.5)	71 (6.3)	2 (0.2)	1 (0.1)	1,135 (100.0)	522	1,657	3.28	0.49
10年～ (%)	2 (0.9)		7 (3.0)	37 (16.0)	91 (39.4)	83 (35.9)	11 (4.8)			231 (100.0)	109	340	3.32	0.47
15年～ (%)			6 (8.7)	23 (33.3)	21 (30.4)	16 (23.2)	3 (4.3)			69 (100.0)	28	97	3.10	0.47
20年～ (%)	1 (6.7)			2 (13.3)	6 (40.0)	6 (40.0)				15 (100.0)	5	20	3.17	0.63
25年～ (%)			1 (12.5)	1 (12.5)	5 (62.5)	1 (12.5)				8 (100.0)		8	3.15	0.44
30年～ (%)				5 (71.4)	1 (14.3)	1 (14.3)				7 (100.0)	3	10	2.93	0.27
35年～ (%)					2 (66.7)	1 (33.3)				3 (100.0)		3	3.33	0.35
40年～ (%)														
合計 (%)	15 (0.3)	71 (1.2)	298 (5.0)	1,037 (17.5)	2,157 (36.3)	1,905 (32.1)	431 (7.3)	21 (0.4)	2 (0.0)	5,937 (100.0)	2,999	8,936	3.28	0.52
不明 (%)					1 (50.0)	1 (50.0)				2 (100.0)	3	5	3.40	0.14
記載なし (%)														
総計 (%)	15 (0.3)	71 (1.2)	298 (5.0)	1,037 (17.5)	2,158 (36.3)	1,906 (32.1)	431 (7.3)	21 (0.4)	2 (0.0)	5,939 (100.0)	3,002	8,941	3.28	0.52
平均	4.67	2.23	2.68	3.28	3.31	3.11	2.63	2.05	3.50	3.15	3.01	3.10		
標準偏差	5.97	2.33	3.42	4.15	3.74	3.51	2.88	2.22	2.12	3.67	3.35	3.56		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査