

表 3290 アルブミン濃度(g/dL) ヘモグロビン濃度(g/dL)別 (腹膜透析患者)

ヘモグロビン 濃度	1.5未満	1.5～	2.0～	2.5～	3.0～	3.5～	4.0～	4.5～	5.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
5未満 (%)			2 (28.6)	4 (57.1)		1 (14.3)				7 (100.0)		7	2.84	0.51
5～ (%)	1 (7.1)		2 (14.3)	2 (14.3)	6 (42.9)	3 (21.4)				14 (100.0)		14	2.94	0.65
6～ (%)		4 (14.8)	5 (18.5)	10 (37.0)	4 (14.8)	4 (14.8)				27 (100.0)	1	28	2.63	0.62
7～ (%)		5 (4.3)	21 (18.1)	34 (29.3)	36 (31.0)	15 (12.9)	5 (4.3)			116 (100.0)	8	124	2.90	0.56
8～ (%)	4 (1.2)	14 (4.1)	35 (10.4)	98 (29.0)	109 (32.2)	75 (22.2)	3 (0.9)			338 (100.0)	6	344	2.98	0.57
9～ (%)	5 (0.6)	16 (1.8)	61 (6.9)	200 (22.6)	315 (35.6)	243 (27.5)	41 (4.6)	2 (0.2)	1 (0.1)	884 (100.0)	19	903	3.16	0.54
10～ (%)	2 (0.1)	13 (0.8)	76 (4.5)	304 (18.0)	692 (40.9)	490 (29.0)	109 (6.4)	4 (0.2)		1,690 (100.0)	16	1,706	3.26	0.48
11～ (%)	1 (0.1)	8 (0.5)	56 (3.3)	224 (13.3)	616 (36.5)	626 (37.1)	150 (8.9)	6 (0.4)		1,687 (100.0)	22	1,709	3.37	0.47
12～ (%)		7 (0.9)	23 (2.9)	108 (13.7)	262 (33.3)	301 (38.2)	79 (10.0)	6 (0.8)	1 (0.1)	787 (100.0)	9	796	3.39	0.49
13～ (%)	1 (0.4)	2 (0.9)	7 (3.0)	23 (9.8)	76 (32.5)	94 (40.2)	29 (12.4)	2 (0.9)		234 (100.0)	3	237	3.45	0.51
14～ (%)			3 (3.8)	12 (15.4)	19 (24.4)	33 (42.3)	10 (12.8)	1 (1.3)		78 (100.0)	1	79	3.47	0.50
合計 (%)	14 (0.2)	69 (1.2)	291 (5.0)	1,019 (17.4)	2,135 (36.4)	1,885 (32.2)	426 (7.3)	21 (0.4)	2 (0.0)	5,862 (100.0)	85	5,947	3.28	0.52
記載なし (%)	1 (1.3)	2 (2.6)	7 (9.1)	18 (23.4)	23 (29.9)	21 (27.3)	5 (6.5)			77 (100.0)	2,917	2,994	3.11	0.60
総計 (%)	15 (0.3)	71 (1.2)	298 (5.0)	1,037 (17.5)	2,158 (36.3)	1,906 (32.1)	431 (7.3)	21 (0.4)	2 (0.0)	5,939 (100.0)	3,002	8,941	3.28	0.52
平均	9.54	9.75	10.07	10.45	10.79	11.07	11.34	11.76	11.10	10.82	10.43	10.81		
標準偏差	1.89	1.74	1.71	1.53	1.29	1.32	1.24	1.35	1.84	1.41	1.70	1.42		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査