

表 3291 アルブミン濃度(g/dL) 総コレステロール濃度(mg/dL)別 (腹膜透析患者)

総コレステロール濃度	1.5未満	1.5～	2.0～	2.5～	3.0～	3.5～	4.0～	4.5～	5.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
100未満 (%)	1 (2.0)	5 (10.0)	3 (6.0)	11 (22.0)	15 (30.0)	10 (20.0)	5 (10.0)			50 (100.0)		50	3.07	0.70
100～ (%)	2 (1.3)	4 (2.5)	16 (10.2)	29 (18.5)	66 (42.0)	32 (20.4)	8 (5.1)			157 (100.0)	3	160	3.10	0.58
120～ (%)	2 (0.5)	10 (2.3)	30 (6.8)	81 (18.4)	172 (39.1)	120 (27.3)	23 (5.2)	2 (0.5)		440 (100.0)	8	448	3.19	0.54
140～ (%)	1 (0.1)	7 (0.9)	43 (5.5)	146 (18.5)	313 (39.7)	222 (28.2)	55 (7.0)	1 (0.1)		788 (100.0)	18	806	3.26	0.50
160～ (%)	1 (0.1)	6 (0.7)	34 (4.0)	146 (17.2)	313 (36.8)	297 (34.9)	53 (6.2)		1 (0.1)	851 (100.0)	14	865	3.31	0.48
180～ (%)	1 (0.1)	6 (0.7)	32 (3.9)	123 (15.0)	297 (36.2)	299 (36.4)	58 (7.1)	4 (0.5)	1 (0.1)	821 (100.0)	12	833	3.34	0.49
200～ (%)		1 (0.2)	18 (3.2)	98 (17.7)	199 (35.9)	195 (35.2)	40 (7.2)	3 (0.5)		554 (100.0)	10	564	3.33	0.47
220～ (%)	1 (0.3)		13 (4.1)	43 (13.6)	128 (40.5)	103 (32.6)	24 (7.6)	4 (1.3)		316 (100.0)	2	318	3.33	0.49
240～ (%)			11 (7.0)	22 (14.0)	46 (29.3)	60 (38.2)	16 (10.2)	2 (1.3)		157 (100.0)	2	159	3.38	0.53
260～ (%)		2 (1.4)	8 (5.5)	22 (15.1)	33 (22.6)	62 (42.5)	18 (12.3)	1 (0.7)		146 (100.0)	3	149	3.37	0.58
合計 (%)	9 (0.2)	41 (1.0)	208 (4.9)	721 (16.8)	1,582 (37.0)	1,400 (32.7)	300 (7.0)	17 (0.4)	2 (0.0)	4,280 (100.0)	72	4,352	3.29	0.51
記載なし (%)	6 (0.4)	30 (1.8)	90 (5.4)	316 (19.0)	576 (34.7)	506 (30.5)	131 (7.9)	4 (0.2)		1,659 (100.0)	2,930	4,589	3.24	0.54
総計 (%)	15 (0.3)	71 (1.2)	298 (5.0)	1,037 (17.5)	2,158 (36.3)	1,906 (32.1)	431 (7.3)	21 (0.4)	2 (0.0)	5,939 (100.0)	3,002	8,941	3.28	0.52
平均	148.33	149.05	174.25	175.60	176.56	183.88	185.67	202.47	184.00	179.10	173.75	179.01		
標準偏差	45.38	43.77	49.57	39.26	38.00	40.67	43.65	40.18	14.14	40.53	41.09	40.54		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査