

表 3292 アルブミン濃度(g/dL) HDL-C濃度(mg/dL)別（腹膜透析患者）

HDL-C濃度	1.5未満	1.5～	2.0～	2.5～	3.0～	3.5～	4.0～	4.5～	5.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)			2 (25.0)	1 (12.5)	2 (25.0)	3 (37.5)				8 (100.0)		8	3.08	0.67
20～ (%)	5 (1.8)	6 (2.1)	15 (5.3)	42 (14.7)	105 (36.8)	88 (30.9)	24 (8.4)			285 (100.0)	3	288	3.26	0.59
30～ (%)	1 (0.1)	9 (1.0)	51 (5.6)	158 (17.3)	289 (31.7)	310 (34.0)	87 (9.5)	8 (0.9)		913 (100.0)	20	933	3.32	0.54
40～ (%)	1 (0.1)	11 (1.1)	46 (4.7)	165 (16.9)	359 (36.8)	320 (32.8)	71 (7.3)	2 (0.2)	1 (0.1)	976 (100.0)	14	990	3.30	0.51
50～ (%)	2 (0.2)	11 (1.3)	27 (3.3)	145 (17.7)	321 (39.2)	261 (31.9)	47 (5.7)	3 (0.4)	1 (0.1)	818 (100.0)	21	839	3.29	0.49
60～ (%)		1 (0.2)	23 (4.6)	81 (16.1)	211 (42.0)	161 (32.1)	24 (4.8)	1 (0.2)		502 (100.0)	14	516	3.28	0.46
70～ (%)			7 (2.7)	43 (16.7)	95 (36.8)	94 (36.4)	18 (7.0)	1 (0.4)		258 (100.0)	1	259	3.34	0.45
80～ (%)			5 (3.6)	22 (15.8)	55 (39.6)	50 (36.0)	7 (5.0)			139 (100.0)	2	141	3.33	0.43
90～ (%)			2 (3.3)	10 (16.4)	29 (47.5)	15 (24.6)	5 (8.2)			61 (100.0)		61	3.31	0.43
100～ (%)		1 (1.8)	1 (1.8)	7 (12.3)	20 (35.1)	21 (36.8)	7 (12.3)			57 (100.0)		57	3.40	0.47
合計 (%)	9 (0.2)	39 (1.0)	179 (4.5)	674 (16.8)	1,486 (37.0)	1,323 (32.9)	290 (7.2)	15 (0.4)	2 (0.0)	4,017 (100.0)	75	4,092	3.30	0.51
記載なし (%)	6 (0.3)	32 (1.7)	119 (6.2)	363 (18.9)	672 (35.0)	583 (30.3)	141 (7.3)	6 (0.3)		1,922 (100.0)	2,927	4,849	3.23	0.54
総計 (%)	15 (0.3)	71 (1.2)	298 (5.0)	1,037 (17.5)	2,158 (36.3)	1,906 (32.1)	431 (7.3)	21 (0.4)	2 (0.0)	5,939 (100.0)	3,002	8,941	3.28	0.52
平均	34.44	45.49	47.01	50.41	51.55	50.50	48.94	45.40	50.00	50.50	48.85	50.47		
標準偏差	13.01	16.85	16.53	17.41	17.70	17.48	20.87	13.92	9.90	17.79	13.60	17.72		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査