

表 3293 アルブミン濃度(g/dL) Non-HDL-C濃度(mg/dL)別 (腹膜透析患者)

Non-HDL-C濃度	1.5未満	1.5～	2.0～	2.5～	3.0～	3.5～	4.0～	4.5～	5.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
50未満 (%)		1 (5.6)	2 (11.1)	1 (5.6)	10 (55.6)	2 (11.1)	2 (11.1)			18 (100.0)		18	3.18	0.63
50～ (%)	1 (0.9)	4 (3.6)	7 (6.4)	15 (13.6)	43 (39.1)	31 (28.2)	9 (8.2)			110 (100.0)	4	114	3.21	0.59
70～ (%)		4 (1.2)	26 (7.5)	67 (19.4)	140 (40.5)	94 (27.2)	15 (4.3)			346 (100.0)	5	351	3.20	0.50
90～ (%)	3 (0.5)	9 (1.4)	27 (4.2)	115 (17.7)	264 (40.7)	187 (28.8)	42 (6.5)	2 (0.3)		649 (100.0)	11	660	3.27	0.51
110～ (%)		4 (0.5)	37 (4.7)	141 (17.9)	293 (37.3)	262 (33.3)	48 (6.1)	1 (0.1)		786 (100.0)	11	797	3.29	0.47
130～ (%)		7 (1.1)	20 (3.1)	104 (16.0)	230 (35.3)	238 (36.5)	48 (7.4)	3 (0.5)	2 (0.3)	652 (100.0)	10	662	3.35	0.50
150～ (%)	2 (0.5)	1 (0.2)	17 (4.0)	66 (15.3)	162 (37.7)	147 (34.2)	33 (7.7)	2 (0.5)		430 (100.0)	6	436	3.33	0.50
170～ (%)	1 (0.4)		11 (4.2)	45 (17.2)	82 (31.4)	95 (36.4)	24 (9.2)	3 (1.1)		261 (100.0)	2	263	3.36	0.51
190～ (%)		1 (0.8)	8 (6.7)	17 (14.2)	33 (27.5)	52 (43.3)	7 (5.8)	2 (1.7)		120 (100.0)		120	3.33	0.52
210～ (%)			9 (10.2)	9 (10.2)	19 (21.6)	37 (42.0)	13 (14.8)	1 (1.1)		88 (100.0)	2	90	3.41	0.61
合計 (%)	7 (0.2)	31 (0.9)	164 (4.7)	580 (16.8)	1,276 (36.9)	1,145 (33.1)	241 (7.0)	14 (0.4)	2 (0.1)	3,460 (100.0)	51	3,511	3.30	0.51
記載なし (%)	8 (0.3)	40 (1.6)	134 (5.4)	457 (18.4)	882 (35.6)	761 (30.7)	190 (7.7)	7 (0.3)		2,479 (100.0)	2,951	5,430	3.25	0.53
総計 (%)	15 (0.3)	71 (1.2)	298 (5.0)	1,037 (17.5)	2,158 (36.3)	1,906 (32.1)	431 (7.3)	21 (0.4)	2 (0.0)	5,939 (100.0)	3,002	8,941	3.28	0.52
平均	123.29	106.58	128.96	125.85	124.75	133.07	134.78	157.71	134.00	128.56	122.31	128.47		
標準偏差	44.79	35.65	47.59	35.30	35.35	38.81	42.19	37.06	4.24	37.96	41.32	38.01		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査