

表 3294 アルブミン濃度(g/dL) 収縮期血圧(mmHg)別 (腹膜透析患者)

収縮期血圧	1.5未満	1.5～	2.0～	2.5～	3.0～	3.5～	4.0～	4.5～	5.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
60未満 (%)						1 (100.0)				1 (100.0)		1	3.70	
60～ (%)		2 (15.4)	3 (23.1)	3 (23.1)	3 (23.1)	2 (15.4)				13 (100.0)		13	2.69	0.61
80～ (%)	4 (3.4)	3 (2.5)	15 (12.6)	30 (25.2)	34 (28.6)	20 (16.8)	13 (10.9)			119 (100.0)	5	124	3.03	0.69
100～ (%)	2 (0.3)	13 (2.1)	47 (7.5)	113 (18.1)	208 (33.4)	198 (31.8)	41 (6.6)	1 (0.2)		623 (100.0)	18	641	3.22	0.55
120～ (%)	4 (0.3)	16 (1.1)	61 (4.2)	243 (16.6)	503 (34.3)	511 (34.9)	119 (8.1)	8 (0.5)	1 (0.1)	1,466 (100.0)	50	1,516	3.32	0.52
140～ (%)		13 (0.8)	50 (3.3)	277 (18.1)	596 (38.9)	499 (32.6)	93 (6.1)	4 (0.3)		1,532 (100.0)	47	1,579	3.29	0.47
160～ (%)		6 (0.9)	28 (4.0)	130 (18.4)	281 (39.9)	218 (30.9)	41 (5.8)	1 (0.1)		705 (100.0)	16	721	3.27	0.48
180～ (%)		1 (0.5)	13 (6.1)	38 (17.8)	94 (43.9)	54 (25.2)	12 (5.6)	1 (0.5)	1 (0.5)	214 (100.0)	3	217	3.23	0.50
200～ (%)				7 (22.6)	14 (45.2)	9 (29.0)	1 (3.2)			31 (100.0)		31	3.26	0.38
220～ (%)				3 (30.0)	5 (50.0)	1 (10.0)	1 (10.0)			10 (100.0)		10	3.16	0.48
合計 (%)	10 (0.2)	54 (1.1)	217 (4.6)	844 (17.9)	1,738 (36.9)	1,513 (32.1)	321 (6.8)	15 (0.3)	2 (0.0)	4,714 (100.0)	139	4,853	3.28	0.51
記載なし (%)	5 (0.4)	17 (1.4)	81 (6.6)	193 (15.8)	420 (34.3)	393 (32.1)	110 (9.0)	6 (0.5)		1,225 (100.0)	2,863	4,088	3.27	0.56
総計 (%)	15 (0.3)	71 (1.2)	298 (5.0)	1,037 (17.5)	2,158 (36.3)	1,906 (32.1)	431 (7.3)	21 (0.4)	2 (0.0)	5,939 (100.0)	3,002	8,941	3.28	0.52
平均	108.30	130.07	134.16	141.19	143.21	140.74	138.78	138.20	157.00	141.10	137.79	141.01		
標準偏差	17.30	25.67	26.74	24.23	22.77	21.42	22.05	20.80	35.36	22.95	20.20	22.88		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査