

表 3295 アルブミン濃度(g/dL) 拡張期血圧(mmHg)別（腹膜透析患者）

拡張期血圧	1.5未満	1.5～	2.0～	2.5～	3.0～	3.5～	4.0～	4.5～	5.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)						1 (100.0)				1 (100.0)		1	3.50	
20～ (%)		3 (20.0)	1 (6.7)	5 (33.3)	3 (20.0)	3 (20.0)				15 (100.0)		15	2.78	0.67
40～ (%)	6 (1.7)	9 (2.5)	36 (10.0)	91 (25.3)	116 (32.2)	85 (23.6)	17 (4.7)			360 (100.0)	15	375	3.06	0.59
60～ (%)	3 (0.1)	23 (1.1)	111 (5.5)	362 (18.0)	759 (37.8)	621 (31.0)	121 (6.0)	5 (0.2)	1 (0.0)	2,006 (100.0)	59	2,065	3.26	0.50
80～ (%)	1 (0.1)	14 (1.1)	33 (2.6)	222 (17.7)	449 (35.7)	434 (34.6)	97 (7.7)	6 (0.5)		1,256 (100.0)	40	1,296	3.32	0.49
90～ (%)		5 (0.7)	23 (3.3)	102 (14.6)	273 (39.2)	241 (34.6)	49 (7.0)	3 (0.4)	1 (0.1)	697 (100.0)	17	714	3.34	0.48
100～ (%)			13 (3.8)	52 (15.3)	124 (36.5)	116 (34.1)	34 (10.0)	1 (0.3)		340 (100.0)	7	347	3.37	0.48
120～ (%)				5 (27.8)	7 (38.9)	5 (27.8)	1 (5.6)			18 (100.0)		18	3.22	0.45
140～ (%)						1 (100.0)				1 (100.0)		1	3.90	
合計 (%)	10 (0.2)	54 (1.2)	217 (4.6)	839 (17.9)	1,731 (36.9)	1,507 (32.1)	319 (6.8)	15 (0.3)	2 (0.0)	4,694 (100.0)	138	4,832	3.28	0.51
記載なし (%)	5 (0.4)	17 (1.4)	81 (6.5)	198 (15.9)	427 (34.3)	399 (32.0)	112 (9.0)	6 (0.5)		1,245 (100.0)	2,864	4,109	3.28	0.55
総計 (%)	15 (0.3)	71 (1.2)	298 (5.0)	1,037 (17.5)	2,158 (36.3)	1,906 (32.1)	431 (7.3)	21 (0.4)	2 (0.0)	5,939 (100.0)	3,002	8,941	3.28	0.52
平均	63.10	71.07	73.53	77.13	79.42	80.29	81.43	82.13	86.00	79.04	78.25	79.01		
標準偏差	9.13	14.69	15.18	14.98	14.24	14.02	13.98	11.78	9.90	14.46	13.53	14.43		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査