

表 3296 アルブミン濃度(g/dL) 脈拍(拍/分)別 (腹膜透析患者)

脈拍	1.5未満	1.5～	2.0～	2.5～	3.0～	3.5～	4.0～	4.5～	5.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
40未満 (%)		1 (20.0)	1 (20.0)		2 (40.0)	1 (20.0)				5 (100.0)		5	2.76	0.84
40～ (%)			3 (12.5)	4 (16.7)	9 (37.5)	6 (25.0)	2 (8.3)			24 (100.0)	1	25	3.21	0.52
50～ (%)	1 (0.6)	1 (0.6)	7 (3.9)	35 (19.4)	83 (46.1)	46 (25.6)	7 (3.9)			180 (100.0)	7	187	3.23	0.47
60～ (%)	4 (0.5)	15 (1.8)	31 (3.8)	162 (19.7)	323 (39.3)	234 (28.5)	51 (6.2)	2 (0.2)		822 (100.0)	28	850	3.23	0.52
70～ (%)	1 (0.1)	10 (0.8)	56 (4.5)	220 (17.8)	455 (36.8)	421 (34.0)	71 (5.7)	2 (0.2)	2 (0.2)	1,238 (100.0)	33	1,271	3.28	0.50
80～ (%)	2 (0.2)	7 (0.7)	59 (5.9)	186 (18.6)	346 (34.6)	328 (32.8)	69 (6.9)	4 (0.4)		1,001 (100.0)	23	1,024	3.27	0.51
90～ (%)	1 (0.2)	7 (1.5)	21 (4.5)	81 (17.2)	149 (31.6)	166 (35.2)	44 (9.3)	2 (0.4)		471 (100.0)	10	481	3.32	0.54
100～ (%)		2 (1.0)	12 (6.2)	28 (14.4)	73 (37.6)	59 (30.4)	18 (9.3)	2 (1.0)		194 (100.0)	10	204	3.32	0.53
110～ (%)		1 (2.0)		7 (13.7)	14 (27.5)	26 (51.0)	2 (3.9)	1 (2.0)		51 (100.0)	1	52	3.43	0.47
120～ (%)		1 (5.6)	1 (5.6)	4 (22.2)	5 (27.8)	4 (22.2)	2 (11.1)	1 (5.6)		18 (100.0)	2	20	3.25	0.65
合計 (%)	9 (0.2)	45 (1.1)	191 (4.8)	727 (18.2)	1,459 (36.4)	1,291 (32.2)	266 (6.6)	14 (0.3)	2 (0.0)	4,004 (100.0)	115	4,119	3.27	0.51
記載なし (%)	6 (0.3)	26 (1.3)	107 (5.5)	310 (16.0)	699 (36.1)	615 (31.8)	165 (8.5)	7 (0.4)		1,935 (100.0)	2,887	4,822	3.28	0.53
総計 (%)	15 (0.3)	71 (1.2)	298 (5.0)	1,037 (17.5)	2,158 (36.3)	1,906 (32.1)	431 (7.3)	21 (0.4)	2 (0.0)	5,939 (100.0)	3,002	8,941	3.28	0.52
平均	71.67	77.44	78.64	77.66	77.08	78.92	80.15	90.14	73.00	78.09	77.95	78.09		
標準偏差	11.99	15.93	13.10	12.84	13.28	13.00	13.30	18.28	4.24	13.20	15.57	13.27		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査