

表 3297 透析前CRP濃度(mg/dL) 治療方法別（透析患者全体）

治療方法	0.2未満	0.2～	0.5～	1.0～	2.0～	4.0～	6.0～	8.0～	10.0～	15.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
施設血液透析 (%)	110,049 (57.4)	36,786 (19.2)	18,887 (9.8)	12,260 (6.4)	7,575 (3.9)	2,720 (1.4)	1,351 (0.7)	739 (0.4)	881 (0.5)	595 (0.3)	191,843 (100.0)	63,798	255,641	0.65	1.96
血液透析濾過 (%)	21,183 (60.1)	6,638 (18.8)	3,256 (9.2)	2,070 (5.9)	1,181 (3.4)	421 (1.2)	176 (0.5)	101 (0.3)	110 (0.3)	90 (0.3)	35,226 (100.0)	8,057	43,283	0.56	1.77
血液濾過 (%)	45 (63.4)	15 (21.1)	4 (5.6)	6 (8.5)					1 (1.4)		71 (100.0)	21	92	0.46	1.69
血液吸着透析 (%)	757 (55.6)	299 (22.0)	132 (9.7)	95 (7.0)	39 (2.9)	17 (1.2)	8 (0.6)	6 (0.4)	8 (0.6)	1 (0.1)	1,362 (100.0)	268	1,630	0.59	1.58
在宅血液透析 (%)	208 (62.7)	74 (22.3)	29 (8.7)	9 (2.7)	8 (2.4)	3 (0.9)	1 (0.3)				332 (100.0)	189	521	0.35	0.77
腹膜透析 (%)	3,067 (58.9)	995 (19.1)	449 (8.6)	308 (5.9)	202 (3.9)	83 (1.6)	40 (0.8)	24 (0.5)	34 (0.7)	7 (0.1)	5,209 (100.0)	3,732	8,941	0.63	1.71
合計 (%)	135,309 (57.8)	44,807 (19.1)	22,757 (9.7)	14,748 (6.3)	9,005 (3.8)	3,244 (1.4)	1,576 (0.7)	870 (0.4)	1,034 (0.4)	693 (0.3)	234,043 (100.0)	76,065	310,108	0.63	1.92
記載なし (%)															
総計 (%)	135,309 (57.8)	44,807 (19.1)	22,757 (9.7)	14,748 (6.3)	9,005 (3.8)	3,244 (1.4)	1,576 (0.7)	870 (0.4)	1,034 (0.4)	693 (0.3)	234,043 (100.0)	76,065	310,108	0.63	1.92

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査