

表 3317 透析前CRP濃度(mg/dL) 性別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

| 性別   | 0.2未満   | 0.2～   | 0.5～   | 1.0～   | 2.0～  | 4.0～  | 6.0～  | 8.0～  | 10.0～ | 15.0～ | 合計      | 記載なし   | 総計      | 平均   | 標準偏差 |
|------|---------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|--------|---------|------|------|
| 男性   | 64,716  | 24,096 | 12,433 | 8,028  | 4,900 | 1,737 | 869   | 452   | 574   | 377   | 118,182 | 28,851 | 147,033 | 0.68 | 1.99 |
| (%)  | (54.8)  | (20.4) | (10.5) | (6.8)  | (4.1) | (1.5) | (0.7) | (0.4) | (0.5) | (0.3) | (100.0) |        |         |      |      |
| 女性   | 40,813  | 11,282 | 5,714  | 3,744  | 2,354 | 845   | 413   | 242   | 268   | 183   | 65,858  | 16,080 | 81,938  | 0.59 | 1.85 |
| (%)  | (62.0)  | (17.1) | (8.7)  | (5.7)  | (3.6) | (1.3) | (0.6) | (0.4) | (0.4) | (0.3) | (100.0) |        |         |      |      |
| 合計   | 105,529 | 35,378 | 18,147 | 11,772 | 7,254 | 2,582 | 1,282 | 694   | 842   | 560   | 184,040 | 44,931 | 228,971 | 0.64 | 1.94 |
| (%)  | (57.3)  | (19.2) | (9.9)  | (6.4)  | (3.9) | (1.4) | (0.7) | (0.4) | (0.5) | (0.3) | (100.0) |        |         |      |      |
| 記載なし |         |        |        |        |       |       |       |       |       |       |         |        |         |      |      |
| (%)  |         |        |        |        |       |       |       |       |       |       |         |        |         |      |      |
| 総計   | 105,529 | 35,378 | 18,147 | 11,772 | 7,254 | 2,582 | 1,282 | 694   | 842   | 560   | 184,040 | 44,931 | 228,971 | 0.64 | 1.94 |
| (%)  | (57.3)  | (19.2) | (9.9)  | (6.4)  | (3.9) | (1.4) | (0.7) | (0.4) | (0.5) | (0.3) | (100.0) |        |         |      |      |

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査