

表 3334 透析前CRP濃度(mg/dL) 性別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

性別	0.2未満	0.2～	0.5～	1.0～	2.0～	4.0～	6.0～	8.0～	10.0～	15.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	12,394	4,392	2,175	1,360	757	278	107	52	73	55	21,643	3,551	25,194	0.58	1.83
(%)	(57.3)	(20.3)	(10.0)	(6.3)	(3.5)	(1.3)	(0.5)	(0.2)	(0.3)	(0.3)	(100.0)				
女性	8,310	2,085	998	643	377	129	64	42	35	29	12,712	2,040	14,752	0.50	1.63
(%)	(65.4)	(16.4)	(7.9)	(5.1)	(3.0)	(1.0)	(0.5)	(0.3)	(0.3)	(0.2)	(100.0)				
合計	20,704	6,477	3,173	2,003	1,134	407	171	94	108	84	34,355	5,591	39,946	0.55	1.76
(%)	(60.3)	(18.9)	(9.2)	(5.8)	(3.3)	(1.2)	(0.5)	(0.3)	(0.3)	(0.2)	(100.0)				
記載なし															
(%)															
総計	20,704	6,477	3,173	2,003	1,134	407	171	94	108	84	34,355	5,591	39,946	0.55	1.76
(%)	(60.3)	(18.9)	(9.2)	(5.8)	(3.3)	(1.2)	(0.5)	(0.3)	(0.3)	(0.2)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査