

表 3351 CRP濃度(mg/dL) 性別（腹膜透析患者）

性別	0.2未満	0.2～	0.5～	1.0～	2.0～	4.0～	6.0～	8.0～	10.0～	15.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	1,850	680	307	217	138	64	28	15	22	5	3,326	2,416	5,742	0.68	1.79
(%)	(55.6)	(20.4)	(9.2)	(6.5)	(4.1)	(1.9)	(0.8)	(0.5)	(0.7)	(0.2)	(100.0)				
女性	1,217	315	142	91	64	19	12	9	12	2	1,883	1,316	3,199	0.54	1.56
(%)	(64.6)	(16.7)	(7.5)	(4.8)	(3.4)	(1.0)	(0.6)	(0.5)	(0.6)	(0.1)	(100.0)				
合計	3,067	995	449	308	202	83	40	24	34	7	5,209	3,732	8,941	0.63	1.71
(%)	(58.9)	(19.1)	(8.6)	(5.9)	(3.9)	(1.6)	(0.8)	(0.5)	(0.7)	(0.1)	(100.0)				
記載なし															
(%)															
総計	3,067	995	449	308	202	83	40	24	34	7	5,209	3,732	8,941	0.63	1.71
(%)	(58.9)	(19.1)	(8.6)	(5.9)	(3.9)	(1.6)	(0.8)	(0.5)	(0.7)	(0.1)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査