

表 3365 CRP濃度(mg/dL) 収縮期血圧(mmHg)別（腹膜透析患者）

収縮期血圧	0.2未満	0.2～	0.5～	1.0～	2.0～	4.0～	6.0～	8.0～	10.0～	15.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
60未満 (%)		1 (100.0)									1 (100.0)		1	0.21	
60～ (%)	4 (30.8)	1 (7.7)	2 (15.4)	2 (15.4)	2 (15.4)	1 (7.7)	1 (7.7)				13 (100.0)		13	1.73	2.13
80～ (%)	47 (47.5)	17 (17.2)	11 (11.1)	7 (7.1)	8 (8.1)	5 (5.1)	2 (2.0)	1 (1.0)	1 (1.0)		99 (100.0)	25	124	1.07	1.99
100～ (%)	326 (57.9)	87 (15.5)	59 (10.5)	40 (7.1)	24 (4.3)	9 (1.6)	7 (1.2)	4 (0.7)	4 (0.7)	3 (0.5)	563 (100.0)	78	641	0.81	2.47
120～ (%)	779 (60.3)	248 (19.2)	103 (8.0)	83 (6.4)	46 (3.6)	17 (1.3)	5 (0.4)	2 (0.2)	7 (0.5)	1 (0.1)	1,291 (100.0)	225	1,516	0.52	1.41
140～ (%)	828 (61.1)	271 (20.0)	102 (7.5)	65 (4.8)	45 (3.3)	21 (1.5)	7 (0.5)	5 (0.4)	10 (0.7)	2 (0.1)	1,356 (100.0)	223	1,579	0.59	1.72
160～ (%)	394 (61.5)	127 (19.8)	49 (7.6)	31 (4.8)	22 (3.4)	8 (1.2)	3 (0.5)	3 (0.5)	4 (0.6)		641 (100.0)	80	721	0.53	1.47
180～ (%)	96 (51.6)	36 (19.4)	22 (11.8)	13 (7.0)	10 (5.4)	6 (3.2)	2 (1.1)		1 (0.5)		186 (100.0)	31	217	0.72	1.56
200～ (%)	14 (50.0)	10 (35.7)	2 (7.1)	1 (3.6)			1 (3.6)				28 (100.0)	3	31	0.49	1.18
220～ (%)	5 (55.6)	2 (22.2)	2 (22.2)								9 (100.0)	1	10	0.29	0.34
合計 (%)	2,493 (59.5)	800 (19.1)	352 (8.4)	242 (5.8)	157 (3.7)	67 (1.6)	28 (0.7)	15 (0.4)	27 (0.6)	6 (0.1)	4,187 (100.0)	666	4,853	0.61	1.72
記載なし (%)	574 (56.2)	195 (19.1)	97 (9.5)	66 (6.5)	45 (4.4)	16 (1.6)	12 (1.2)	9 (0.9)	7 (0.7)	1 (0.1)	1,022 (100.0)	3,066	4,088	0.71	1.68
総計 (%)	3,067 (58.9)	995 (19.1)	449 (8.6)	308 (5.9)	202 (3.9)	83 (1.6)	40 (0.8)	24 (0.5)	34 (0.7)	7 (0.1)	5,209 (100.0)	3,732	8,941	0.63	1.71
平均	141.37	142.97	140.26	138.28	139.98	138.67	136.29	136.40	137.63	123.67	141.21	139.78	141.01		
標準偏差	21.98	22.99	25.18	23.97	26.22	27.75	33.90	26.06	21.88	19.65	22.97	22.28	22.88		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査