

表 3367 CRP濃度(mg/dL) 脈拍(拍/分)別(腹膜透析患者)

脈拍	0.2未満	0.2～	0.5～	1.0～	2.0～	4.0～	6.0～	8.0～	10.0～	15.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
40未満 (%)	3 (100.0)										3 (100.0)	2	5	0.15	0.03
40～ (%)	14 (60.9)	6 (26.1)	1 (4.3)	1 (4.3)	1 (4.3)						23 (100.0)	2	25	0.31	0.51
50～ (%)	119 (71.7)	24 (14.5)	10 (6.0)	8 (4.8)	2 (1.2)	1 (0.6)			2 (1.2)		166 (100.0)	21	187	0.41	1.48
60～ (%)	455 (61.4)	141 (19.0)	59 (8.0)	35 (4.7)	25 (3.4)	8 (1.1)	11 (1.5)		5 (0.7)	2 (0.3)	741 (100.0)	109	850	0.62	2.07
70～ (%)	678 (61.1)	211 (19.0)	109 (9.8)	56 (5.0)	32 (2.9)	11 (1.0)	4 (0.4)	5 (0.5)	3 (0.3)		1,109 (100.0)	162	1,271	0.46	1.13
80～ (%)	528 (58.7)	175 (19.4)	68 (7.6)	57 (6.3)	34 (3.8)	18 (2.0)	6 (0.7)	7 (0.8)	6 (0.7)	1 (0.1)	900 (100.0)	124	1,024	0.66	1.77
90～ (%)	243 (55.0)	89 (20.1)	39 (8.8)	28 (6.3)	28 (6.3)	8 (1.8)	2 (0.5)	2 (0.5)	3 (0.7)		442 (100.0)	39	481	0.68	1.56
100～ (%)	98 (57.3)	31 (18.1)	17 (9.9)	12 (7.0)	7 (4.1)	4 (2.3)	1 (0.6)			1 (0.6)	171 (100.0)	33	204	0.68	1.81
110～ (%)	24 (57.1)	9 (21.4)	2 (4.8)	2 (4.8)	2 (4.8)	1 (2.4)			1 (2.4)	1 (2.4)	42 (100.0)	10	52	1.41	4.75
120～ (%)	11 (64.7)	3 (17.6)	2 (11.8)	1 (5.9)							17 (100.0)	3	20	0.30	0.39
合計 (%)	2,173 (60.1)	689 (19.1)	307 (8.5)	200 (5.5)	131 (3.6)	51 (1.4)	24 (0.7)	14 (0.4)	20 (0.6)	5 (0.1)	3,614 (100.0)	505	4,119	0.59	1.70
記載なし (%)	894 (56.1)	306 (19.2)	142 (8.9)	108 (6.8)	71 (4.5)	32 (2.0)	16 (1.0)	10 (0.6)	14 (0.9)	2 (0.1)	1,595 (100.0)	3,227	4,822	0.72	1.74
総計 (%)	3,067 (58.9)	995 (19.1)	449 (8.6)	308 (5.9)	202 (3.9)	83 (1.6)	40 (0.8)	24 (0.5)	34 (0.7)	7 (0.1)	5,209 (100.0)	3,732	8,941	0.63	1.71
平均	77.46	78.36	78.89	79.63	80.88	81.78	75.50	80.57	79.80	84.00	78.08	78.17	78.09		
標準偏差	13.32	12.91	13.40	12.89	12.90	12.16	11.49	7.27	14.59	20.65	13.21	13.69	13.27		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査