

表 3368 透析前補正カルシウム濃度(mg/dL) 治療方法別（透析患者全体）

治療方法	7.0未満	7.0～	7.5～	8.0～	8.4～	8.5～	9.0～	9.5～	10.0～	10.1～	10.5～	11.0～	11.5～	12.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
施設血液透析 （％）	931 (0.4)	1,331 (0.6)	5,245 (2.3)	17,062 (7.5)	4,898 (2.2)	56,432 (24.8)	68,011 (29.9)	44,086 (19.4)	5,416 (2.4)	13,732 (6.0)	6,692 (2.9)	2,269 (1.0)	802 (0.4)	575 (0.3)	227,482 (100.0)	28,159	255,641	9.18	0.74
血液透析濾過 （％）	168 (0.4)	268 (0.7)	974 (2.5)	2,943 (7.4)	839 (2.1)	9,555 (24.1)	11,831 (29.8)	7,826 (19.7)	928 (2.3)	2,518 (6.4)	1,206 (3.0)	389 (1.0)	135 (0.3)	73 (0.2)	39,653 (100.0)	3,630	43,283	9.19	0.75
血液濾過 （％）	1 (1.1)		1 (1.1)	3 (3.4)	1 (1.1)	17 (19.1)	19 (21.3)	23 (25.8)	2 (2.2)	12 (13.5)	8 (9.0)		1 (1.1)	1 (1.1)	89 (100.0)	3	92	9.51	0.83
血液吸着透析 （％）	9 (0.6)	11 (0.7)	43 (2.8)	114 (7.4)	39 (2.5)	335 (21.7)	432 (28.0)	313 (20.3)	44 (2.9)	129 (8.4)	54 (3.5)	11 (0.7)	5 (0.3)	4 (0.3)	1,543 (100.0)	87	1,630	9.21	0.78
在宅血液透析 （％）	4 (1.0)	3 (0.8)	9 (2.3)	31 (7.9)	9 (2.3)	74 (18.8)	109 (27.7)	92 (23.4)	17 (4.3)	29 (7.4)	14 (3.6)	1 (0.3)	1 (0.3)	1 (0.3)	394 (100.0)	127	521	9.22	0.81
腹膜透析 （％）	29 (0.5)	36 (0.6)	127 (2.1)	286 (4.8)	86 (1.5)	906 (15.3)	1,602 (27.1)	1,629 (27.6)	191 (3.2)	557 (9.4)	296 (5.0)	111 (1.9)	29 (0.5)	27 (0.5)	5,912 (100.0)	3,029	8,941	9.41	0.80
合計 （％）	1,142 (0.4)	1,649 (0.6)	6,399 (2.3)	20,439 (7.4)	5,872 (2.1)	67,319 (24.5)	82,004 (29.8)	53,969 (19.6)	6,598 (2.4)	16,977 (6.2)	8,270 (3.0)	2,781 (1.0)	973 (0.4)	681 (0.2)	275,073 (100.0)	35,035	310,108	9.19	0.74
記載なし （％）																			
総計 （％）	1,142 (0.4)	1,649 (0.6)	6,399 (2.3)	20,439 (7.4)	5,872 (2.1)	67,319 (24.5)	82,004 (29.8)	53,969 (19.6)	6,598 (2.4)	16,977 (6.2)	8,270 (3.0)	2,781 (1.0)	973 (0.4)	681 (0.2)	275,073 (100.0)	35,035	310,108	9.19	0.74

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する％です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査