

表 3384 透析前補正カルシウム濃度(mg/dL) 透析前収縮期血圧(mmHg)別（透析患者全体）

透析前収縮期血圧	7.0未満	7.0～	7.5～	8.0～	8.4～	8.5～	9.0～	9.5～	10.0～	10.1～	10.5～	11.0～	11.5～	12.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
60未満 (%)				2 (5.1)		6 (15.4)	15 (38.5)	7 (17.9)	2 (5.1)	4 (10.3)	2 (5.1)			1 (2.6)	39 (100.0)	1	40	9.46	0.78
60～ (%)		1 (0.2)	17 (4.1)	24 (5.8)	13 (3.1)	80 (19.3)	95 (22.9)	93 (22.5)	10 (2.4)	39 (9.4)	20 (4.8)	11 (2.7)	5 (1.2)	6 (1.4)	414 (100.0)	19	433	9.39	0.91
80～ (%)	33 (1.0)	25 (0.8)	79 (2.4)	213 (6.6)	64 (2.0)	660 (20.4)	938 (28.9)	653 (20.1)	94 (2.9)	253 (7.8)	135 (4.2)	56 (1.7)	26 (0.8)	14 (0.4)	3,243 (100.0)	95	3,338	9.27	0.85
100～ (%)	93 (0.5)	132 (0.8)	394 (2.3)	1,259 (7.3)	364 (2.1)	4,018 (23.4)	4,951 (28.8)	3,397 (19.8)	457 (2.7)	1,152 (6.7)	601 (3.5)	229 (1.3)	67 (0.4)	60 (0.3)	17,174 (100.0)	433	17,607	9.21	0.78
120～ (%)	220 (0.4)	351 (0.7)	1,227 (2.4)	3,982 (7.6)	1,116 (2.1)	12,893 (24.8)	15,667 (30.1)	10,133 (19.5)	1,224 (2.4)	3,021 (5.8)	1,468 (2.8)	489 (0.9)	180 (0.3)	114 (0.2)	52,085 (100.0)	1,186	53,271	9.17	0.74
140～ (%)	299 (0.4)	419 (0.5)	1,784 (2.3)	5,830 (7.4)	1,677 (2.1)	19,930 (25.2)	23,976 (30.3)	15,605 (19.7)	1,840 (2.3)	4,624 (5.8)	2,121 (2.7)	671 (0.8)	228 (0.3)	152 (0.2)	79,156 (100.0)	1,666	80,822	9.17	0.72
160～ (%)	210 (0.4)	314 (0.6)	1,276 (2.2)	4,155 (7.3)	1,172 (2.1)	13,886 (24.3)	17,275 (30.3)	11,207 (19.6)	1,343 (2.4)	3,608 (6.3)	1,751 (3.1)	565 (1.0)	194 (0.3)	123 (0.2)	57,079 (100.0)	1,116	58,195	9.19	0.73
180～ (%)	78 (0.4)	124 (0.6)	459 (2.1)	1,579 (7.2)	501 (2.3)	5,407 (24.8)	6,410 (29.4)	4,236 (19.4)	554 (2.5)	1,396 (6.4)	718 (3.3)	203 (0.9)	90 (0.4)	57 (0.3)	21,812 (100.0)	412	22,224	9.20	0.75
200～ (%)	18 (0.3)	29 (0.5)	131 (2.4)	417 (7.7)	125 (2.3)	1,337 (24.5)	1,607 (29.5)	1,053 (19.3)	129 (2.4)	334 (6.1)	161 (3.0)	74 (1.4)	19 (0.3)	16 (0.3)	5,450 (100.0)	96	5,546	9.19	0.75
220～ (%)	1 (0.1)	6 (0.5)	20 (1.8)	88 (7.8)	18 (1.6)	298 (26.3)	284 (25.1)	227 (20.1)	30 (2.7)	84 (7.4)	38 (3.4)	23 (2.0)	6 (0.5)	8 (0.7)	1,131 (100.0)	29	1,160	9.26	0.79
合計 (%)	952 (0.4)	1,401 (0.6)	5,387 (2.3)	17,549 (7.4)	5,050 (2.1)	58,515 (24.6)	71,218 (30.0)	46,611 (19.6)	5,683 (2.4)	14,515 (6.1)	7,015 (3.0)	2,321 (1.0)	815 (0.3)	551 (0.2)	237,583 (100.0)	5,053	242,636	9.19	0.74
記載なし (%)	190 (0.5)	248 (0.7)	1,012 (2.7)	2,890 (7.7)	822 (2.2)	8,804 (23.5)	10,786 (28.8)	7,358 (19.6)	915 (2.4)	2,462 (6.6)	1,255 (3.3)	460 (1.2)	158 (0.4)	130 (0.3)	37,490 (100.0)	29,982	67,472	9.20	0.78
総計 (%)	1,142 (0.4)	1,649 (0.6)	6,399 (2.3)	20,439 (7.4)	5,872 (2.1)	67,319 (24.5)	82,004 (29.8)	53,969 (19.6)	6,598 (2.4)	16,977 (6.2)	8,270 (3.0)	2,781 (1.0)	973 (0.4)	681 (0.2)	275,073 (100.0)	35,035	310,108	9.19	0.74
平均	147.22	148.83	150.37	151.07	151.33	151.45	151.23	151.12	150.92	151.21	151.05	150.39	150.27	150.17	151.18	148.86	151.13		
標準偏差	24.98	25.03	24.33	24.04	24.34	23.87	23.86	24.28	24.83	25.07	25.72	27.30	27.34	29.43	24.21	24.79	24.23		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査