

表 3400 透析前補正カルシウム濃度(mg/dL) 透析前収縮期血圧(mmHg)別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

透析前収縮 期血圧	7.0未満	7.0～	7.5～	8.0～	8.4～	8.5～	9.0～	9.5～	10.0～	10.1～	10.5～	11.0～	11.5～	12.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
60未満 (%)				2 (5.9)		5 (14.7)	14 (41.2)	6 (17.6)	2 (5.9)	3 (8.8)	1 (2.9)			1 (2.9)	34 (100.0)	1	35	9.43	0.78
60～ (%)		1 (0.4)	11 (4.2)	15 (5.8)	7 (2.7)	55 (21.2)	52 (20.1)	63 (24.3)	7 (2.7)	23 (8.9)	10 (3.9)	7 (2.7)	5 (1.9)	3 (1.2)	259 (100.0)	12	271	9.37	0.92
80～ (%)	22 (1.0)	18 (0.8)	56 (2.4)	147 (6.4)	47 (2.0)	479 (20.7)	674 (29.2)	475 (20.6)	66 (2.9)	171 (7.4)	87 (3.8)	37 (1.6)	21 (0.9)	10 (0.4)	2,310 (100.0)	67	2,377	9.26	0.85
100～ (%)	68 (0.5)	80 (0.6)	274 (2.1)	945 (7.4)	273 (2.1)	3,052 (23.8)	3,749 (29.3)	2,489 (19.4)	339 (2.6)	834 (6.5)	433 (3.4)	171 (1.3)	55 (0.4)	46 (0.4)	12,808 (100.0)	347	13,155	9.21	0.78
120～ (%)	166 (0.4)	284 (0.7)	959 (2.4)	3,098 (7.6)	864 (2.1)	10,171 (25.0)	12,272 (30.2)	7,804 (19.2)	957 (2.4)	2,292 (5.6)	1,151 (2.8)	369 (0.9)	144 (0.4)	93 (0.2)	40,624 (100.0)	952	41,576	9.17	0.74
140～ (%)	229 (0.4)	313 (0.5)	1,376 (2.2)	4,665 (7.4)	1,345 (2.1)	15,941 (25.4)	19,112 (30.4)	12,261 (19.5)	1,486 (2.4)	3,621 (5.8)	1,661 (2.6)	529 (0.8)	180 (0.3)	120 (0.2)	62,839 (100.0)	1,364	64,203	9.17	0.72
160～ (%)	159 (0.3)	255 (0.6)	999 (2.2)	3,363 (7.3)	946 (2.1)	11,241 (24.5)	13,897 (30.3)	8,985 (19.6)	1,091 (2.4)	2,901 (6.3)	1,373 (3.0)	457 (1.0)	153 (0.3)	101 (0.2)	45,921 (100.0)	922	46,843	9.19	0.73
180～ (%)	59 (0.3)	101 (0.6)	357 (2.0)	1,279 (7.2)	419 (2.4)	4,419 (25.0)	5,181 (29.4)	3,401 (19.3)	440 (2.5)	1,126 (6.4)	576 (3.3)	161 (0.9)	75 (0.4)	50 (0.3)	17,644 (100.0)	358	18,002	9.20	0.74
200～ (%)	18 (0.4)	23 (0.5)	106 (2.4)	343 (7.7)	99 (2.2)	1,067 (24.1)	1,319 (29.8)	859 (19.4)	106 (2.4)	268 (6.0)	142 (3.2)	60 (1.4)	12 (0.3)	10 (0.2)	4,432 (100.0)	83	4,515	9.19	0.75
220～ (%)	1 (0.1)	4 (0.5)	18 (2.1)	68 (7.8)	16 (1.8)	228 (26.3)	210 (24.2)	178 (20.5)	24 (2.8)	67 (7.7)	28 (3.2)	16 (1.8)	2 (0.2)	7 (0.8)	867 (100.0)	27	894	9.25	0.79
合計 (%)	722 (0.4)	1,079 (0.6)	4,156 (2.2)	13,925 (7.4)	4,016 (2.1)	46,658 (24.9)	56,480 (30.1)	36,521 (19.5)	4,518 (2.4)	11,306 (6.0)	5,462 (2.9)	1,807 (1.0)	647 (0.3)	441 (0.2)	187,738 (100.0)	4,133	191,871	9.18	0.73
記載なし (%)	152 (0.5)	187 (0.6)	815 (2.7)	2,365 (7.8)	660 (2.2)	7,244 (23.9)	8,756 (28.9)	5,883 (19.4)	709 (2.3)	1,971 (6.5)	991 (3.3)	358 (1.2)	122 (0.4)	98 (0.3)	30,311 (100.0)	6,789	37,100	9.19	0.78
総計 (%)	874 (0.4)	1,266 (0.6)	4,971 (2.3)	16,290 (7.5)	4,676 (2.1)	53,902 (24.7)	65,236 (29.9)	42,404 (19.4)	5,227 (2.4)	13,277 (6.1)	6,453 (3.0)	2,165 (1.0)	769 (0.4)	539 (0.2)	218,049 (100.0)	10,922	228,971	9.18	0.74
平均	147.88	149.93	150.91	151.62	152.02	151.84	151.66	151.70	151.48	152.02	151.88	151.15	149.55	151.02	151.69	149.62	151.64		
標準偏差	24.94	24.69	24.07	23.84	24.15	23.68	23.65	24.11	24.62	24.74	25.38	26.97	26.90	28.91	24.00	24.74	24.02		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査