

表 3406 透析前補正カルシウム濃度(mg/dL) 原疾患別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

原疾患	7.0未満	7.0～	7.5～	8.0～	8.4～	8.5～	9.0～	9.5～	10.0～	10.1～	10.5～	11.0～	11.5～	12.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
慢性糸球体腎炎 (%)	60 (0.4)	107 (0.7)	355 (2.4)	1,017 (7.0)	297 (2.0)	3,298 (22.6)	4,238 (29.0)	3,062 (20.9)	388 (2.7)	1,039 (7.1)	520 (3.6)	157 (1.1)	45 (0.3)	35 (0.2)	14,618 (100.0)	458	15,076	9.23	0.76
慢性腎盂腎炎 (%)	2 (0.5)	7 (1.7)	14 (3.4)	24 (5.9)	3 (0.7)	90 (22.1)	125 (30.7)	80 (19.7)	11 (2.7)	26 (6.4)	18 (4.4)	4 (1.0)	2 (0.5)	1 (0.2)	407 (100.0)	15	422	9.21	0.79
急速進行性糸球 体腎炎 (%)		2 (0.7)	4 (1.4)	23 (8.3)	5 (1.8)	67 (24.2)	90 (32.5)	57 (20.6)	5 (1.8)	17 (6.1)	6 (2.2)	1 (0.4)			277 (100.0)	7	284	9.15	0.64
妊娠腎/妊娠中毒 症 (%)		2 (0.6)	8 (2.3)	31 (8.8)	4 (1.1)	66 (18.8)	104 (29.5)	81 (23.0)	10 (2.8)	27 (7.7)	11 (3.1)	5 (1.4)	3 (0.9)		352 (100.0)	7	359	9.28	0.74
その他の分類不 能の腎炎 (%)	1 (0.5)	3 (1.6)	5 (2.7)	6 (3.2)	7 (3.7)	47 (25.0)	59 (31.4)	32 (17.0)	7 (3.7)	7 (3.7)	9 (4.8)	3 (1.6)	1 (0.5)	1 (0.5)	188 (100.0)	7	195	9.20	0.84
多発性嚢胞腎 (%)	2 (0.1)	9 (0.6)	34 (2.4)	87 (6.2)	28 (2.0)	317 (22.5)	412 (29.3)	318 (22.6)	41 (2.9)	95 (6.8)	45 (3.2)	16 (1.1)		2 (0.1)	1,406 (100.0)	58	1,464	9.24	0.71
腎硬化症 (%)	7 (0.2)	16 (0.6)	72 (2.6)	216 (7.7)	59 (2.1)	697 (24.8)	868 (30.8)	537 (19.1)	61 (2.2)	162 (5.8)	73 (2.6)	30 (1.1)	10 (0.4)	6 (0.2)	2,814 (100.0)	72	2,886	9.17	0.72
悪性高血圧 (%)	2 (0.7)	1 (0.3)	10 (3.3)	28 (9.3)	10 (3.3)	70 (23.3)	98 (32.7)	51 (17.0)	2 (0.7)	16 (5.3)	9 (3.0)	1 (0.3)	2 (0.7)		300 (100.0)	12	312	9.10	0.74
糖尿病性腎症 (%)	66 (0.5)	68 (0.5)	309 (2.4)	996 (7.8)	298 (2.3)	3,364 (26.4)	3,889 (30.5)	2,274 (17.9)	252 (2.0)	714 (5.6)	330 (2.6)	103 (0.8)	51 (0.4)	17 (0.1)	12,731 (100.0)	442	13,173	9.14	0.73
SLE腎炎 (%)	2 (0.6)	4 (1.1)	5 (1.4)	27 (7.7)	10 (2.8)	81 (23.0)	102 (29.0)	81 (23.0)	6 (1.7)	24 (6.8)	6 (1.7)	2 (0.6)	1 (0.3)	1 (0.3)	352 (100.0)	11	363	9.17	0.76
アミロイド腎 (%)				6 (10.3)	1 (1.7)	12 (20.7)	18 (31.0)	16 (27.6)		4 (6.9)		1 (1.7)			58 (100.0)	1	59	9.21	0.59
痛風腎 (%)		1 (0.7)	6 (4.1)	5 (3.4)	3 (2.1)	29 (19.9)	39 (26.7)	41 (28.1)	3 (2.1)	13 (8.9)	4 (2.7)	2 (1.4)			146 (100.0)	8	154	9.28	0.73
先天性代謝異常 による腎不全 (%)				3 (7.3)	4 (9.8)	6 (14.6)	12 (29.3)	10 (24.4)	1 (2.4)	3 (7.3)		2 (4.9)			41 (100.0)	3	44	9.28	0.68
腎・尿路結核 (%)	1 (5.0)			1 (5.0)		6 (30.0)	7 (35.0)	3 (15.0)	1 (5.0)		1 (5.0)				20 (100.0)	2	22	9.04	0.81
腎・尿路結石 (%)				6 (9.0)		16 (23.9)	19 (28.4)	11 (16.4)	4 (6.0)	5 (7.5)	2 (3.0)	3 (4.5)	1 (1.5)		67 (100.0)	2	69	9.38	0.78
腎・尿路腫瘍 (%)				6 (7.2)		28 (33.7)	18 (21.7)	17 (20.5)	2 (2.4)	6 (7.2)	4 (4.8)	2 (2.4)			83 (100.0)	2	85	9.29	0.70
閉塞性尿路障害 (%)		1 (1.4)	3 (4.2)	10 (14.1)	3 (4.2)	13 (18.3)	14 (19.7)	18 (25.4)	1 (1.4)	5 (7.0)	1 (1.4)	1 (1.4)	1 (1.4)		71 (100.0)	3	74	9.13	0.84
骨髄腫 (%)				3 (15.8)		4 (21.1)	1 (5.3)	7 (36.8)		1 (5.3)	3 (15.8)				19 (100.0)		19	9.37	0.82
腎形成不全 (%)	1 (1.0)		8 (8.2)	8 (8.2)	4 (4.1)	23 (23.7)	27 (27.8)	15 (15.5)	2 (2.1)	2 (2.1)	2 (2.1)	2 (2.1)	3 (3.1)		97 (100.0)	4	101	9.08	0.90
不明 (%)	14 (0.4)	27 (0.8)	85 (2.6)	266 (8.0)	60 (1.8)	807 (24.4)	981 (29.6)	652 (19.7)	75 (2.3)	203 (6.1)	90 (2.7)	35 (1.1)	8 (0.2)	7 (0.2)	3,310 (100.0)	170	3,480	9.17	0.75
再導入 (%)		6 (1.5)	11 (2.7)	34 (8.4)	9 (2.2)	79 (19.5)	121 (29.9)	84 (20.7)	14 (3.5)	31 (7.7)	9 (2.2)	6 (1.5)	1 (0.2)		405 (100.0)	11	416	9.20	0.74
その他 (%)	2 (0.2)	5 (0.6)	22 (2.6)	65 (7.8)	13 (1.6)	181 (21.7)	273 (32.8)	165 (19.8)	17 (2.0)	52 (6.2)	27 (3.2)	7 (0.8)	3 (0.4)	1 (0.1)	833 (100.0)	56	889	9.20	0.74
合計 (%)	160 (0.4)	259 (0.7)	951 (2.5)	2,868 (7.4)	818 (2.1)	9,301 (24.1)	11,515 (29.8)	7,612 (19.7)	903 (2.3)	2,452 (6.4)	1,170 (3.0)	383 (1.0)	132 (0.3)	71 (0.2)	38,595 (100.0)	1,351	39,946	9.19	0.75
記載なし (%)																			
総計 (%)	160 (0.4)	259 (0.7)	951 (2.5)	2,868 (7.4)	818 (2.1)	9,301 (24.1)	11,515 (29.8)	7,612 (19.7)	903 (2.3)	2,452 (6.4)	1,170 (3.0)	383 (1.0)	132 (0.3)	71 (0.2)	38,595 (100.0)	1,351	39,946	9.19	0.75

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する％です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査