

表 3408 透析前補正カルシウム濃度(mg/dL) 透析後体重(kg)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

透析後体重	7.0未満	7.0～	7.5～	8.0～	8.4～	8.5～	9.0～	9.5～	10.0～	10.1～	10.5～	11.0～	11.5～	12.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)			1 (10.0)	2 (20.0)		2 (20.0)	3 (30.0)	1 (10.0)		1 (10.0)					10 (100.0)	2	12	8.91	0.68
20～ (%)			4 (5.5)	3 (4.1)	2 (2.7)	14 (19.2)	21 (28.8)	13 (17.8)	3 (4.1)	4 (5.5)	5 (6.8)	1 (1.4)	2 (2.7)	1 (1.4)	73 (100.0)	3	76	9.40	0.93
30～ (%)	11 (0.4)	22 (0.8)	55 (2.1)	161 (6.1)	53 (2.0)	582 (22.0)	755 (28.6)	550 (20.8)	67 (2.5)	198 (7.5)	115 (4.4)	45 (1.7)	13 (0.5)	13 (0.5)	2,640 (100.0)	42	2,682	9.28	0.81
40～ (%)	39 (0.4)	51 (0.5)	196 (2.0)	654 (6.7)	197 (2.0)	2,281 (23.2)	2,950 (30.0)	2,011 (20.5)	245 (2.5)	690 (7.0)	330 (3.4)	126 (1.3)	36 (0.4)	25 (0.3)	9,831 (100.0)	174	10,005	9.24	0.75
50～ (%)	41 (0.3)	80 (0.7)	320 (2.6)	900 (7.3)	242 (2.0)	2,930 (23.9)	3,705 (30.2)	2,425 (19.7)	308 (2.5)	799 (6.5)	357 (2.9)	111 (0.9)	48 (0.4)	16 (0.1)	12,282 (100.0)	208	12,490	9.19	0.73
60～ (%)	46 (0.6)	61 (0.7)	201 (2.4)	688 (8.3)	197 (2.4)	2,012 (24.4)	2,477 (30.1)	1,601 (19.4)	175 (2.1)	459 (5.6)	234 (2.8)	60 (0.7)	19 (0.2)	12 (0.1)	8,242 (100.0)	123	8,365	9.14	0.74
70～ (%)	13 (0.4)	25 (0.7)	105 (3.1)	285 (8.4)	80 (2.4)	889 (26.4)	968 (28.7)	644 (19.1)	68 (2.0)	183 (5.4)	75 (2.2)	27 (0.8)	8 (0.2)	3 (0.1)	3,373 (100.0)	50	3,423	9.12	0.72
80～ (%)	7 (0.6)	12 (1.0)	36 (2.9)	105 (8.4)	24 (1.9)	330 (26.4)	380 (30.4)	232 (18.5)	23 (1.8)	64 (5.1)	29 (2.3)	7 (0.6)	3 (0.2)		1,252 (100.0)	21	1,273	9.10	0.72
90～ (%)	2 (0.4)	3 (0.7)	19 (4.3)	36 (8.1)	11 (2.5)	127 (28.5)	133 (29.8)	60 (13.5)	6 (1.3)	33 (7.4)	13 (2.9)	3 (0.7)			446 (100.0)	9	455	9.08	0.72
100～ (%)		3 (2.1)	4 (2.9)	12 (8.6)	4 (2.9)	39 (27.9)	34 (24.3)	37 (26.4)	1 (0.7)	3 (2.1)	1 (0.7)	1 (0.7)	1 (0.7)		140 (100.0)	2	142	9.06	0.70
110～ (%)			1 (1.6)	5 (8.2)	1 (1.6)	19 (31.1)	23 (37.7)	6 (9.8)	1 (1.6)	5 (8.2)					61 (100.0)		61	9.07	0.57
120～ (%)	1 (2.7)			2 (5.4)	2 (5.4)	10 (27.0)	15 (40.5)	5 (13.5)	2 (5.4)						37 (100.0)		37	9.03	0.60
合計 (%)	160 (0.4)	257 (0.7)	942 (2.5)	2,853 (7.4)	813 (2.1)	9,235 (24.1)	11,464 (29.9)	7,585 (19.8)	899 (2.3)	2,439 (6.4)	1,159 (3.0)	381 (1.0)	130 (0.3)	70 (0.2)	38,387 (100.0)	634	39,021	9.19	0.75
記載なし (%)		2 (1.0)	9 (4.3)	15 (7.2)	5 (2.4)	66 (31.7)	51 (24.5)	27 (13.0)	4 (1.9)	13 (6.3)	11 (5.3)	2 (1.0)	2 (1.0)	1 (0.5)	208 (100.0)	717	925	9.15	0.81
総計 (%)	160 (0.4)	259 (0.7)	951 (2.5)	2,868 (7.4)	818 (2.1)	9,301 (24.1)	11,515 (29.8)	7,612 (19.7)	903 (2.3)	2,452 (6.4)	1,170 (3.0)	383 (1.0)	132 (0.3)	71 (0.2)	38,595 (100.0)	1,351	39,946	9.19	0.75
平均	58.07	58.25	57.90	57.90	57.52	57.33	56.65	56.16	55.43	55.34	54.61	52.99	53.52	50.00	56.64	55.70	56.63		
標準偏差	13.68	13.50	13.57	12.98	13.55	13.26	13.02	12.84	12.40	12.67	12.28	12.31	12.10	11.03	13.03	13.08	13.03		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査