

表 3409 透析前補正カルシウム濃度(mg/dL) 透析前リン濃度(mg/dL)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

透析前リン濃度	7.0未満	7.0～	7.5～	8.0～	8.4～	8.5～	9.0～	9.5～	10.0～	10.1～	10.5～	11.0～	11.5～	12.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
3未満 (%)	7 (0.6)	6 (0.5)	15 (1.3)	50 (4.5)	18 (1.6)	248 (22.2)	297 (26.6)	239 (21.4)	35 (3.1)	101 (9.0)	59 (5.3)	23 (2.1)	12 (1.1)	8 (0.7)	1,118 (100.0)	15	1,133	9.37	0.86
3.0～ (%)	4 (0.3)	13 (0.8)	32 (2.1)	117 (7.5)	35 (2.2)	379 (24.3)	457 (29.4)	310 (19.9)	40 (2.6)	98 (6.3)	48 (3.1)	16 (1.0)	4 (0.3)	4 (0.3)	1,557 (100.0)	17	1,574	9.20	0.73
3.5～ (%)	3 (0.1)	10 (0.4)	54 (1.9)	169 (6.0)	60 (2.1)	661 (23.5)	900 (32.0)	529 (18.8)	83 (2.9)	190 (6.7)	111 (3.9)	28 (1.0)	11 (0.4)	6 (0.2)	2,815 (100.0)	34	2,849	9.25	0.71
4.0～ (%)	20 (0.4)	24 (0.5)	88 (1.9)	309 (6.8)	102 (2.3)	1,138 (25.1)	1,381 (30.5)	922 (20.4)	95 (2.1)	275 (6.1)	119 (2.6)	39 (0.9)	10 (0.2)	3 (0.1)	4,525 (100.0)	40	4,565	9.18	0.72
4.5～ (%)	17 (0.3)	23 (0.4)	115 (2.0)	396 (7.0)	123 (2.2)	1,332 (23.5)	1,793 (31.7)	1,138 (20.1)	133 (2.3)	359 (6.3)	164 (2.9)	43 (0.8)	16 (0.3)	12 (0.2)	5,664 (100.0)	48	5,712	9.21	0.70
5.0～ (%)	19 (0.3)	35 (0.6)	135 (2.2)	401 (6.6)	112 (1.8)	1,508 (24.8)	1,866 (30.7)	1,247 (20.5)	143 (2.4)	367 (6.0)	168 (2.8)	62 (1.0)	16 (0.3)	4 (0.1)	6,083 (100.0)	51	6,134	9.20	0.71
5.5～ (%)	12 (0.2)	27 (0.5)	129 (2.5)	389 (7.4)	97 (1.8)	1,339 (25.5)	1,564 (29.8)	1,040 (19.8)	103 (2.0)	322 (6.1)	143 (2.7)	45 (0.9)	22 (0.4)	12 (0.2)	5,244 (100.0)	55	5,299	9.18	0.72
6.0～ (%)	6 (0.6)	5 (0.5)	16 (1.7)	72 (7.7)	20 (2.1)	219 (23.3)	298 (31.7)	178 (19.0)	24 (2.6)	65 (6.9)	22 (2.3)	8 (0.9)	5 (0.5)	1 (0.1)	939 (100.0)	11	950	9.19	0.72
6.1～ (%)	15 (0.5)	28 (0.9)	96 (3.0)	276 (8.6)	63 (2.0)	735 (22.9)	955 (29.7)	636 (19.8)	77 (2.4)	193 (6.0)	97 (3.0)	24 (0.7)	12 (0.4)	5 (0.2)	3,212 (100.0)	32	3,244	9.16	0.76
6.5～ (%)	19 (0.7)	26 (0.9)	80 (2.9)	237 (8.5)	63 (2.3)	703 (25.3)	768 (27.7)	502 (18.1)	68 (2.4)	184 (6.6)	83 (3.0)	30 (1.1)	10 (0.4)	4 (0.1)	2,777 (100.0)	29	2,806	9.14	0.79
7.0～ (%)	8 (0.5)	18 (1.0)	64 (3.6)	150 (8.5)	46 (2.6)	408 (23.2)	486 (27.6)	334 (19.0)	38 (2.2)	111 (6.3)	61 (3.5)	29 (1.6)	4 (0.2)	4 (0.2)	1,761 (100.0)	14	1,775	9.16	0.80
7.5～ (%)	6 (0.6)	19 (1.7)	33 (3.0)	118 (10.9)	35 (3.2)	247 (22.7)	276 (25.4)	192 (17.7)	22 (2.0)	73 (6.7)	44 (4.0)	16 (1.5)	3 (0.3)	3 (0.3)	1,087 (100.0)	17	1,104	9.13	0.84
8.0～ (%)	5 (0.8)	8 (1.2)	31 (4.8)	71 (11.0)	12 (1.9)	141 (21.9)	167 (25.9)	112 (17.4)	19 (2.9)	46 (7.1)	18 (2.8)	10 (1.6)	3 (0.5)	2 (0.3)	645 (100.0)	6	651	9.12	0.87
8.5～ (%)	5 (1.2)	7 (1.7)	23 (5.5)	34 (8.1)	7 (1.7)	91 (21.8)	122 (29.2)	78 (18.7)	10 (2.4)	22 (5.3)	11 (2.6)	4 (1.0)	2 (0.5)	2 (0.5)	418 (100.0)	5	423	9.10	0.86
9.0～ (%)	14 (2.1)	10 (1.5)	33 (4.9)	72 (10.7)	24 (3.6)	132 (19.6)	161 (24.0)	147 (21.9)	11 (1.6)	40 (6.0)	20 (3.0)	5 (0.7)	2 (0.3)	1 (0.1)	672 (100.0)	10	682	9.04	0.90
合計 (%)	160 (0.4)	259 (0.7)	944 (2.5)	2,861 (7.4)	817 (2.1)	9,281 (24.1)	11,491 (29.8)	7,604 (19.7)	901 (2.3)	2,446 (6.4)	1,168 (3.0)	382 (1.0)	132 (0.3)	71 (0.2)	38,517 (100.0)	384	38,901	9.19	0.75
記載なし (%)			7 (9.0)	7 (9.0)	1 (1.3)	20 (25.6)	24 (30.8)	8 (10.3)	2 (2.6)	6 (7.7)	2 (2.6)	1 (1.3)			78 (100.0)	967	1,045	9.08	0.79
総計 (%)	160 (0.4)	259 (0.7)	951 (2.5)	2,868 (7.4)	818 (2.1)	9,301 (24.1)	11,515 (29.8)	7,612 (19.7)	903 (2.3)	2,452 (6.4)	1,170 (3.0)	383 (1.0)	132 (0.3)	71 (0.2)	38,595 (100.0)	1,351	39,946	9.19	0.75
平均	6.00	5.88	5.75	5.57	5.45	5.34	5.30	5.33	5.27	5.31	5.29	5.36	5.18	5.23	5.35	5.42	5.36		
標準偏差	1.99	1.68	1.60	1.48	1.53	1.38	1.36	1.42	1.42	1.48	1.51	1.54	1.66	1.91	1.42	1.59	1.43		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査