

表 3414 透析前補正カルシウム濃度(mg/dL) HDL-C濃度(mg/dL)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

HDL-C濃度	7.0未満	7.0～	7.5～	8.0～	8.4～	8.5～	9.0～	9.5～	10.0～	10.1～	10.5～	11.0～	11.5～	12.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)		1 (1.3)		3 (3.8)	1 (1.3)	14 (17.5)	22 (27.5)	17 (21.3)		8 (10.0)	6 (7.5)	3 (3.8)	3 (3.8)	2 (2.5)	80 (100.0)	1	81	9.64	1.07
20～ (%)	5 (0.3)	11 (0.6)	62 (3.3)	142 (7.7)	39 (2.1)	457 (24.6)	543 (29.3)	342 (18.4)	41 (2.2)	116 (6.3)	55 (3.0)	26 (1.4)	11 (0.6)	4 (0.2)	1,854 (100.0)	20	1,874	9.18	0.76
30～ (%)	16 (0.3)	52 (0.9)	161 (2.6)	440 (7.2)	130 (2.1)	1,529 (25.1)	1,872 (30.8)	1,158 (19.0)	137 (2.3)	356 (5.8)	163 (2.7)	47 (0.8)	19 (0.3)	6 (0.1)	6,086 (100.0)	45	6,131	9.16	0.71
40～ (%)	38 (0.5)	42 (0.6)	181 (2.5)	560 (7.7)	136 (1.9)	1,793 (24.5)	2,125 (29.1)	1,430 (19.6)	181 (2.5)	477 (6.5)	229 (3.1)	81 (1.1)	20 (0.3)	11 (0.2)	7,304 (100.0)	56	7,360	9.19	0.74
50～ (%)	21 (0.4)	39 (0.7)	130 (2.2)	449 (7.6)	122 (2.1)	1,448 (24.4)	1,769 (29.8)	1,183 (20.0)	133 (2.2)	378 (6.4)	177 (3.0)	49 (0.8)	19 (0.3)	10 (0.2)	5,927 (100.0)	44	5,971	9.19	0.73
60～ (%)	10 (0.3)	21 (0.5)	87 (2.3)	270 (7.0)	82 (2.1)	922 (24.1)	1,177 (30.7)	789 (20.6)	88 (2.3)	229 (6.0)	120 (3.1)	26 (0.7)	7 (0.2)	4 (0.1)	3,832 (100.0)	25	3,857	9.19	0.70
70～ (%)	5 (0.2)	14 (0.7)	47 (2.3)	157 (7.8)	38 (1.9)	450 (22.4)	642 (32.0)	403 (20.1)	47 (2.3)	121 (6.0)	63 (3.1)	18 (0.9)	2 (0.1)		2,007 (100.0)	16	2,023	9.19	0.70
80～ (%)	3 (0.3)	11 (1.1)	21 (2.1)	60 (6.0)	20 (2.0)	218 (21.7)	341 (34.0)	205 (20.4)	21 (2.1)	68 (6.8)	25 (2.5)	8 (0.8)	2 (0.2)	1 (0.1)	1,004 (100.0)	9	1,013	9.20	0.70
90～ (%)	1 (0.2)	1 (0.2)	6 (1.4)	18 (4.2)	11 (2.6)	103 (23.9)	141 (32.7)	98 (22.7)	10 (2.3)	32 (7.4)	9 (2.1)			1 (0.2)	431 (100.0)		431	9.23	0.66
100～ (%)	1 (0.3)	1 (0.3)	7 (1.8)	27 (7.1)	8 (2.1)	72 (18.9)	119 (31.2)	86 (22.6)	8 (2.1)	33 (8.7)	14 (3.7)	4 (1.0)		1 (0.3)	381 (100.0)	2	383	9.28	0.72
合計 (%)	100 (0.3)	193 (0.7)	702 (2.4)	2,126 (7.4)	587 (2.0)	7,006 (24.2)	8,751 (30.3)	5,711 (19.8)	666 (2.3)	1,818 (6.3)	861 (3.0)	262 (0.9)	83 (0.3)	40 (0.1)	28,906 (100.0)	218	29,124	9.19	0.73
記載なし (%)	60 (0.6)	66 (0.7)	249 (2.6)	742 (7.7)	231 (2.4)	2,295 (23.7)	2,764 (28.5)	1,901 (19.6)	237 (2.4)	634 (6.5)	309 (3.2)	121 (1.2)	49 (0.5)	31 (0.3)	9,689 (100.0)	1,133	10,822	9.19	0.80
総計 (%)	160 (0.4)	259 (0.7)	951 (2.5)	2,868 (7.4)	818 (2.1)	9,301 (24.1)	11,515 (29.8)	7,612 (19.7)	903 (2.3)	2,452 (6.4)	1,170 (3.0)	383 (1.0)	132 (0.3)	71 (0.2)	38,595 (100.0)	1,351	39,946	9.19	0.75
平均	49.93	49.43	49.23	50.29	50.75	50.30	51.29	51.46	50.88	51.48	50.77	48.23	44.47	46.95	50.86	49.56	50.85		
標準偏差	15.08	16.41	16.40	16.74	17.22	16.77	17.50	17.41	16.69	17.89	16.87	16.63	14.65	17.94	17.19	16.36	17.18		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査