

表 3416 透析前補正カルシウム濃度(mg/dL) 透析前収縮期血圧(mmHg)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

透析前収縮期血圧	7.0未満	7.0～	7.5～	8.0～	8.4～	8.5～	9.0～	9.5～	10.0～	10.1～	10.5～	11.0～	11.5～	12.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
60未満 (%)						1 (50.0)	1 (50.0)								2 (100.0)		2	8.95	0.64
60～ (%)			4 (3.6)	9 (8.0)	4 (3.6)	19 (17.0)	32 (28.6)	20 (17.9)	2 (1.8)	12 (10.7)	6 (5.4)	2 (1.8)		2 (1.8)	112 (100.0)	3	115	9.37	0.90
80～ (%)	4 (0.7)	6 (1.0)	16 (2.7)	51 (8.5)	14 (2.3)	118 (19.6)	183 (30.4)	107 (17.8)	16 (2.7)	44 (7.3)	27 (4.5)	10 (1.7)	2 (0.3)	3 (0.5)	601 (100.0)	14	615	9.23	0.84
100～ (%)	12 (0.4)	40 (1.4)	87 (3.2)	219 (7.9)	57 (2.1)	640 (23.2)	768 (27.8)	556 (20.1)	63 (2.3)	183 (6.6)	90 (3.3)	29 (1.1)	9 (0.3)	7 (0.3)	2,760 (100.0)	40	2,800	9.17	0.78
120～ (%)	36 (0.5)	50 (0.7)	182 (2.4)	607 (8.1)	165 (2.2)	1,868 (24.8)	2,263 (30.1)	1,433 (19.1)	175 (2.3)	439 (5.8)	197 (2.6)	77 (1.0)	16 (0.2)	13 (0.2)	7,521 (100.0)	118	7,639	9.16	0.74
140～ (%)	48 (0.4)	74 (0.7)	281 (2.5)	815 (7.2)	234 (2.1)	2,785 (24.7)	3,390 (30.1)	2,269 (20.1)	227 (2.0)	698 (6.2)	300 (2.7)	98 (0.9)	34 (0.3)	16 (0.1)	11,269 (100.0)	164	11,433	9.17	0.73
160～ (%)	32 (0.4)	42 (0.5)	195 (2.4)	587 (7.2)	171 (2.1)	1,931 (23.6)	2,507 (30.6)	1,614 (19.7)	188 (2.3)	524 (6.4)	283 (3.5)	78 (1.0)	33 (0.4)	13 (0.2)	8,198 (100.0)	110	8,308	9.20	0.74
180～ (%)	13 (0.4)	13 (0.4)	74 (2.4)	234 (7.5)	59 (1.9)	724 (23.2)	921 (29.5)	632 (20.2)	90 (2.9)	213 (6.8)	111 (3.6)	27 (0.9)	12 (0.4)	3 (0.1)	3,126 (100.0)	28	3,154	9.21	0.74
200～ (%)		4 (0.5)	21 (2.6)	53 (6.5)	19 (2.3)	225 (27.6)	232 (28.5)	156 (19.1)	18 (2.2)	55 (6.7)	14 (1.7)	11 (1.3)	6 (0.7)	1 (0.1)	815 (100.0)	7	822	9.20	0.71
220～ (%)		2 (0.9)	2 (0.9)	14 (6.5)	2 (0.9)	57 (26.6)	56 (26.2)	41 (19.2)	6 (2.8)	15 (7.0)	8 (3.7)	6 (2.8)	4 (1.9)	1 (0.5)	214 (100.0)	2	216	9.29	0.82
合計 (%)	145 (0.4)	231 (0.7)	862 (2.5)	2,589 (7.5)	725 (2.1)	8,368 (24.2)	10,353 (29.9)	6,828 (19.7)	785 (2.3)	2,183 (6.3)	1,036 (3.0)	338 (1.0)	116 (0.3)	59 (0.2)	34,618 (100.0)	486	35,104	9.18	0.74
記載なし (%)	15 (0.4)	28 (0.7)	89 (2.2)	279 (7.0)	93 (2.3)	933 (23.5)	1,162 (29.2)	784 (19.7)	118 (3.0)	269 (6.8)	134 (3.4)	45 (1.1)	16 (0.4)	12 (0.3)	3,977 (100.0)	865	4,842	9.22	0.76
総計 (%)	160 (0.4)	259 (0.7)	951 (2.5)	2,868 (7.4)	818 (2.1)	9,301 (24.1)	11,515 (29.8)	7,612 (19.7)	903 (2.3)	2,452 (6.4)	1,170 (3.0)	383 (1.0)	132 (0.3)	71 (0.2)	38,595 (100.0)	1,351	39,946	9.19	0.75
平均	147.07	143.83	148.98	149.55	149.87	150.90	150.85	150.99	151.45	151.18	151.32	150.38	157.97	144.05	150.72	146.85	150.67		
標準偏差	23.23	26.38	25.59	24.97	24.97	24.76	24.72	24.93	25.62	26.00	26.25	27.67	29.26	30.73	25.04	24.59	25.04		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査