

表 3419 補正カルシウム濃度(mg/dL) 性別（腹膜透析患者）

性別	7.0未満	7.0～	7.5～	8.0～	8.4～	8.5～	9.0～	9.5～	10.0～	10.1～	10.5～	11.0～	11.5～	12.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	22	26	87	218	65	642	1,060	1,035	101	284	154	53	15	12	3,774	1,968	5,742	9.32	0.78
(%)	(0.6)	(0.7)	(2.3)	(5.8)	(1.7)	(17.0)	(28.1)	(27.4)	(2.7)	(7.5)	(4.1)	(1.4)	(0.4)	(0.3)	(100.0)				
女性	7	10	40	68	21	264	542	594	90	273	142	58	14	15	2,138	1,061	3,199	9.55	0.81
(%)	(0.3)	(0.5)	(1.9)	(3.2)	(1.0)	(12.3)	(25.4)	(27.8)	(4.2)	(12.8)	(6.6)	(2.7)	(0.7)	(0.7)	(100.0)				
合計	29	36	127	286	86	906	1,602	1,629	191	557	296	111	29	27	5,912	3,029	8,941	9.41	0.80
(%)	(0.5)	(0.6)	(2.1)	(4.8)	(1.5)	(15.3)	(27.1)	(27.6)	(3.2)	(9.4)	(5.0)	(1.9)	(0.5)	(0.5)	(100.0)				
記載なし																			
(%)																			
総計	29	36	127	286	86	906	1,602	1,629	191	557	296	111	29	27	5,912	3,029	8,941	9.41	0.80
(%)	(0.5)	(0.6)	(2.1)	(4.8)	(1.5)	(15.3)	(27.1)	(27.6)	(3.2)	(9.4)	(5.0)	(1.9)	(0.5)	(0.5)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査