

表 3422 補正カルシウム濃度(mg/dL) 原疾患別（腹膜透析患者）

原疾患	7.0未満	7.0～	7.5～	8.0～	8.4～	8.5～	9.0～	9.5～	10.0～	10.1～	10.5～	11.0～	11.5～	12.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
慢性糸球体腎炎 (%)	11 (0.5)	13 (0.6)	31 (1.5)	88 (4.3)	22 (1.1)	277 (13.5)	551 (26.8)	603 (29.3)	71 (3.4)	230 (11.2)	108 (5.2)	37 (1.8)	8 (0.4)	8 (0.4)	2,058 (100.0)	1,001	3,059	9.46	0.79
慢性腎盂腎炎 (%)				4 (6.0)	1 (1.5)	10 (14.9)	23 (34.3)	14 (20.9)	3 (4.5)	8 (11.9)	2 (3.0)	1 (1.5)		1 (1.5)	67 (100.0)	26	93	9.44	0.77
急速進行性糸球 体腎炎 (%)				5 (10.4)		10 (20.8)	15 (31.3)	11 (22.9)	1 (2.1)	3 (6.3)	3 (6.3)				48 (100.0)	26	74	9.28	0.64
妊娠腎/妊娠中毒 症 (%)			1 (4.3)	1 (4.3)	1 (4.3)	4 (17.4)	4 (17.4)	5 (21.7)	2 (8.7)	3 (13.0)	1 (4.3)	1 (4.3)			23 (100.0)	9	32	9.45	0.78
その他の分類不 能の腎炎 (%)			2 (3.5)	3 (5.3)	2 (3.5)	3 (5.3)	17 (29.8)	20 (35.1)	1 (1.8)	2 (3.5)	5 (8.8)	1 (1.8)		1 (1.8)	57 (100.0)	28	85	9.48	0.86
多発性囊胞腎 (%)	1 (0.6)		5 (3.2)	7 (4.5)	3 (1.9)	26 (16.8)	35 (22.6)	35 (22.6)	2 (1.3)	19 (12.3)	12 (7.7)	6 (3.9)	4 (2.6)		155 (100.0)	88	243	9.51	0.93
腎硬化症 (%)	2 (0.3)	4 (0.5)	16 (2.2)	28 (3.8)	10 (1.4)	129 (17.6)	208 (28.4)	199 (27.2)	31 (4.2)	60 (8.2)	28 (3.8)	8 (1.1)	3 (0.4)	6 (0.8)	732 (100.0)	351	1,083	9.39	0.76
悪性高血圧 (%)		1 (1.5)		1 (1.5)	1 (1.5)	12 (17.6)	23 (33.8)	17 (25.0)	3 (4.4)	8 (11.8)		1 (1.5)	1 (1.5)		68 (100.0)	39	107	9.41	0.66
糖尿病性腎症 (%)	9 (0.5)	13 (0.7)	49 (2.7)	103 (5.7)	35 (2.0)	307 (17.1)	503 (28.1)	469 (26.2)	49 (2.7)	137 (7.6)	76 (4.2)	34 (1.9)	5 (0.3)	3 (0.2)	1,792 (100.0)	974	2,766	9.32	0.77
SLE腎炎 (%)			2 (4.8)	2 (4.8)		5 (11.9)	11 (26.2)	9 (21.4)	2 (4.8)	3 (7.1)	6 (14.3)		2 (4.8)		42 (100.0)	20	62	9.60	0.93
アミロイド腎 (%)	1 (25.0)	1 (25.0)				1 (25.0)	1 (25.0)								4 (100.0)	5	9	8.02	1.06
痛風腎 (%)			1 (4.0)	2 (8.0)		3 (12.0)	4 (16.0)	10 (40.0)		5 (20.0)					25 (100.0)	8	33	9.39	0.68
先天性代謝異常 による腎不全 (%)				1 (7.1)		2 (14.3)	3 (21.4)	5 (35.7)	1 (7.1)		2 (14.3)				14 (100.0)	4	18	9.50	0.71
腎・尿路結核 (%)							1 (100.0)								1 (100.0)		1	9.40	
腎・尿路結石 (%)						2 (20.0)	3 (30.0)	4 (40.0)	1 (10.0)						10 (100.0)	6	16	9.42	0.51
腎・尿路腫瘍 (%)							2 (22.2)	6 (66.7)			1 (11.1)				9 (100.0)	5	14	9.73	0.42
閉塞性尿路障害 (%)					2 (12.5)	1 (6.3)		7 (43.8)	4 (25.0)			1 (6.3)		1 (6.3)	16 (100.0)	6	22	9.84	0.94
骨髄腫 (%)						3 (60.0)		1 (20.0)			1 (20.0)				5 (100.0)	3	8	9.30	0.79
腎形成不全 (%)	1 (2.0)	1 (2.0)		2 (3.9)	2 (3.9)	5 (9.8)	8 (15.7)	17 (33.3)	1 (2.0)	5 (9.8)	3 (5.9)	4 (7.8)	1 (2.0)	1 (2.0)	51 (100.0)	25	76	9.58	1.15
不明 (%)	2 (0.4)	3 (0.6)	17 (3.2)	30 (5.6)	5 (0.9)	79 (14.7)	139 (25.9)	147 (27.4)	19 (3.5)	47 (8.8)	33 (6.1)	9 (1.7)	3 (0.6)	4 (0.7)	537 (100.0)	303	840	9.41	0.84
再導入 (%)				4 (11.1)		2 (5.6)	9 (25.0)	11 (30.6)	1 (2.8)	6 (16.7)		2 (5.6)		1 (2.8)	36 (100.0)	15	51	9.60	0.85
その他 (%)	2 (1.2)		3 (1.9)	5 (3.1)	2 (1.2)	25 (15.4)	42 (25.9)	39 (24.1)	4 (2.5)	16 (9.9)	15 (9.3)	6 (3.7)	2 (1.2)	1 (0.6)	162 (100.0)	87	249	9.50	0.93
合計 (%)	29 (0.5)	36 (0.6)	127 (2.1)	286 (4.8)	86 (1.5)	906 (15.3)	1,602 (27.1)	1,629 (27.6)	191 (3.2)	557 (9.4)	296 (5.0)	111 (1.9)	29 (0.5)	27 (0.5)	5,912 (100.0)	3,029	8,941	9.41	0.80
記載なし (%)																			
総計 (%)	29 (0.5)	36 (0.6)	127 (2.1)	286 (4.8)	86 (1.5)	906 (15.3)	1,602 (27.1)	1,629 (27.6)	191 (3.2)	557 (9.4)	296 (5.0)	111 (1.9)	29 (0.5)	27 (0.5)	5,912 (100.0)	3,029	8,941	9.41	0.80

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する％です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査