

表 3425 補正カルシウム濃度(mg/dL) リン濃度(mg/dL)別 (腹膜透析患者)

リン濃度	7.0未満	7.0～	7.5～	8.0～	8.4～	8.5～	9.0～	9.5～	10.0～	10.1～	10.5～	11.0～	11.5～	12.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
3未満 (%)	1 (0.8)		1 (0.8)	1 (0.8)		17 (13.8)	33 (26.8)	33 (26.8)	3 (2.4)	17 (13.8)	7 (5.7)	10 (8.1)			123 (100.0)	3	126	9.64	0.80
3.0～ (%)	2 (0.8)	1 (0.4)	4 (1.5)	7 (2.6)	1 (0.4)	32 (12.1)	76 (28.7)	74 (27.9)	9 (3.4)	28 (10.6)	16 (6.0)	11 (4.2)	2 (0.8)	2 (0.8)	265 (100.0)	5	270	9.54	0.85
3.5～ (%)	2 (0.4)		3 (0.6)	19 (3.7)	7 (1.4)	63 (12.2)	142 (27.6)	167 (32.4)	14 (2.7)	61 (11.8)	28 (5.4)	6 (1.2)	2 (0.4)	1 (0.2)	515 (100.0)	10	525	9.51	0.68
4.0～ (%)	3 (0.4)	7 (0.9)	15 (2.0)	27 (3.6)	14 (1.8)	119 (15.7)	213 (28.0)	196 (25.8)	21 (2.8)	83 (10.9)	37 (4.9)	17 (2.2)	5 (0.7)	3 (0.4)	760 (100.0)	10	770	9.42	0.80
4.5～ (%)	5 (0.5)	1 (0.1)	18 (2.0)	36 (3.9)	12 (1.3)	145 (15.9)	260 (28.4)	257 (28.1)	31 (3.4)	83 (9.1)	49 (5.4)	11 (1.2)	2 (0.2)	4 (0.4)	914 (100.0)	7	921	9.41	0.75
5.0～ (%)	3 (0.3)	3 (0.3)	14 (1.5)	49 (5.3)	4 (0.4)	163 (17.5)	259 (27.8)	257 (27.5)	38 (4.1)	72 (7.7)	54 (5.8)	10 (1.1)	2 (0.2)	5 (0.5)	933 (100.0)	15	948	9.40	0.74
5.5～ (%)	4 (0.5)	8 (1.0)	22 (2.6)	43 (5.2)	20 (2.4)	125 (15.0)	211 (25.4)	242 (29.1)	29 (3.5)	70 (8.4)	34 (4.1)	13 (1.6)	6 (0.7)	5 (0.6)	832 (100.0)	7	839	9.38	0.81
6.0～ (%)		1 (0.7)	4 (3.0)	14 (10.4)	3 (2.2)	17 (12.7)	44 (32.8)	29 (21.6)	5 (3.7)	9 (6.7)	4 (3.0)	4 (3.0)			134 (100.0)	4	138	9.27	0.76
6.1～ (%)	2 (0.4)	2 (0.4)	11 (2.4)	25 (5.3)	7 (1.5)	74 (15.8)	123 (26.3)	125 (26.7)	14 (3.0)	43 (9.2)	25 (5.3)	11 (2.4)	3 (0.6)	3 (0.6)	468 (100.0)	9	477	9.41	0.82
6.5～ (%)	3 (0.8)	3 (0.8)	14 (3.5)	24 (6.0)	7 (1.8)	58 (14.6)	109 (27.5)	108 (27.2)	12 (3.0)	33 (8.3)	17 (4.3)	6 (1.5)	1 (0.3)	2 (0.5)	397 (100.0)	2	399	9.31	0.82
7.0～ (%)	1 (0.5)	3 (1.4)	4 (1.9)	11 (5.2)	2 (0.9)	42 (19.9)	45 (21.3)	56 (26.5)	6 (2.8)	22 (10.4)	14 (6.6)	2 (0.9)	2 (0.9)	1 (0.5)	211 (100.0)	1	212	9.39	0.83
7.5～ (%)	1 (0.7)	3 (2.0)	4 (2.7)	8 (5.4)	1 (0.7)	21 (14.2)	38 (25.7)	40 (27.0)	4 (2.7)	14 (9.5)	5 (3.4)	6 (4.1)	2 (1.4)	1 (0.7)	148 (100.0)	1	149	9.42	1.02
8.0～ (%)		1 (1.4)	5 (7.1)	6 (8.6)	2 (2.9)	7 (10.0)	14 (20.0)	16 (22.9)	2 (2.9)	12 (17.1)	2 (2.9)	2 (2.9)	1 (1.4)		70 (100.0)	1	71	9.36	0.93
8.5～ (%)	1 (2.7)		3 (8.1)	5 (13.5)	2 (5.4)	6 (16.2)	8 (21.6)	7 (18.9)	1 (2.7)	2 (5.4)	1 (2.7)	1 (2.7)			37 (100.0)	1	38	9.02	0.96
9.0～ (%)	1 (1.1)	3 (3.4)	5 (5.7)	10 (11.4)	3 (3.4)	17 (19.3)	22 (25.0)	15 (17.0)	2 (2.3)	6 (6.8)	3 (3.4)		1 (1.1)		88 (100.0)	1	89	9.00	0.95
合計 (%)	29 (0.5)	36 (0.6)	127 (2.2)	285 (4.8)	85 (1.4)	906 (15.4)	1,597 (27.1)	1,622 (27.5)	191 (3.2)	555 (9.4)	296 (5.0)	110 (1.9)	29 (0.5)	27 (0.5)	5,895 (100.0)	77	5,972	9.41	0.80
記載なし (%)				1 (5.9)	1 (5.9)		5 (29.4)	7 (41.2)		2 (11.8)		1 (5.9)			17 (100.0)	2,952	2,969	9.59	0.69
総計 (%)	29 (0.5)	36 (0.6)	127 (2.1)	286 (4.8)	86 (1.5)	906 (15.3)	1,602 (27.1)	1,629 (27.6)	191 (3.2)	557 (9.4)	296 (5.0)	111 (1.9)	29 (0.5)	27 (0.5)	5,912 (100.0)	3,029	8,941	9.41	0.80
平均	5.34	6.08	5.85	5.68	5.58	5.30	5.20	5.19	5.25	5.12	5.13	4.98	5.58	5.23	5.25	5.07	5.25		
標準偏差	1.61	1.64	1.72	1.49	1.41	1.33	1.33	1.27	1.26	1.37	1.28	1.53	1.55	1.11	1.35	1.42	1.35		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査