

表 3426 補正カルシウム濃度(mg/dL) PTH値(pg/mL)別（腹膜透析患者）PTH測定法:intact-PTH

PTH値	7.0未満	7.0～	7.5～	8.0～	8.4～	8.5～	9.0～	9.5～	10.0～	10.1～	10.5～	11.0～	11.5～	12.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)	1 (0.8)			1 (0.8)	2 (1.7)	7 (5.8)	16 (13.3)	28 (23.3)	3 (2.5)	22 (18.3)	23 (19.2)	9 (7.5)	1 (0.8)	7 (5.8)	120 (100.0)	3	123	10.10	1.01
20～ (%)			3 (1.1)	10 (3.6)	3 (1.1)	22 (7.9)	39 (14.0)	79 (28.3)	10 (3.6)	61 (21.9)	34 (12.2)	12 (4.3)	2 (0.7)	4 (1.4)	279 (100.0)	2	281	9.84	0.81
40～ (%)	1 (0.4)		2 (0.8)	5 (1.9)	1 (0.4)	30 (11.4)	54 (20.5)	82 (31.2)	16 (6.1)	35 (13.3)	20 (7.6)	12 (4.6)	3 (1.1)	2 (0.8)	263 (100.0)	5	268	9.71	0.79
60～ (%)		2 (0.6)	4 (1.3)	6 (1.9)	3 (1.0)	43 (14.0)	72 (23.4)	93 (30.2)	9 (2.9)	49 (15.9)	18 (5.8)	6 (1.9)	2 (0.6)	1 (0.3)	308 (100.0)	7	315	9.57	0.70
80～ (%)	1 (0.3)		2 (0.7)	14 (4.6)	1 (0.3)	37 (12.1)	87 (28.4)	98 (32.0)	12 (3.9)	31 (10.1)	16 (5.2)	2 (0.7)	3 (1.0)	2 (0.7)	306 (100.0)	3	309	9.50	0.77
100～ (%)		1 (0.3)	6 (1.9)	3 (1.0)	2 (0.6)	45 (14.6)	96 (31.1)	92 (29.8)	10 (3.2)	39 (12.6)	9 (2.9)	3 (1.0)	1 (0.3)	2 (0.6)	309 (100.0)	7	316	9.49	0.67
120～ (%)	3 (1.0)		3 (1.0)	14 (4.7)	3 (1.0)	46 (15.3)	76 (25.2)	87 (28.9)	17 (5.6)	34 (11.3)	14 (4.7)	4 (1.3)			301 (100.0)	4	305	9.43	0.75
140～ (%)	1 (0.4)	1 (0.4)	6 (2.1)	5 (1.8)	2 (0.7)	38 (13.4)	83 (29.2)	92 (32.4)	11 (3.9)	24 (8.5)	14 (4.9)	6 (2.1)		1 (0.4)	284 (100.0)	1	285	9.46	0.73
160～ (%)		1 (0.4)	3 (1.1)	11 (4.0)	2 (0.7)	44 (16.2)	81 (29.8)	85 (31.3)	9 (3.3)	20 (7.4)	11 (4.0)	3 (1.1)		2 (0.7)	272 (100.0)	4	276	9.40	0.66
180～ (%)	3 (0.5)	2 (0.3)	7 (1.1)	31 (4.9)	14 (2.2)	104 (16.3)	187 (29.3)	198 (31.0)	18 (2.8)	38 (5.9)	25 (3.9)	9 (1.4)	3 (0.5)		639 (100.0)	15	654	9.35	0.71
240～ (%)				1 (10.0)	1 (10.0)	2 (20.0)	1 (10.0)	1 (10.0)	1 (10.0)	3 (30.0)	1 (10.0)				10 (100.0)		10	9.65	0.83
241～ (%)	2 (0.5)	3 (0.7)	11 (2.6)	24 (5.6)	5 (1.2)	73 (17.1)	136 (31.8)	114 (26.6)	11 (2.6)	25 (5.8)	16 (3.7)	8 (1.9)			428 (100.0)	3	431	9.29	0.72
300～ (%)	2 (0.6)	1 (0.3)	6 (1.8)	24 (7.3)	10 (3.0)	77 (23.3)	100 (30.3)	72 (21.8)	5 (1.5)	19 (5.8)	9 (2.7)	4 (1.2)	1 (0.3)		330 (100.0)	1	331	9.19	0.75
360～ (%)	3 (1.5)	3 (1.5)	10 (5.1)	14 (7.1)	2 (1.0)	35 (17.9)	60 (30.6)	44 (22.4)	3 (1.5)	13 (6.6)	7 (3.6)		1 (0.5)	1 (0.5)	196 (100.0)	4	200	9.15	0.84
420～ (%)	1 (0.7)	3 (2.2)	12 (8.6)	15 (10.8)	3 (2.2)	26 (18.7)	43 (30.9)	20 (14.4)	4 (2.9)	8 (5.8)	2 (1.4)	1 (0.7)	1 (0.7)		139 (100.0)		139	9.00	0.89
480～ (%)		2 (4.9)	2 (4.9)	5 (12.2)	2 (4.9)	11 (26.8)	11 (26.8)	4 (9.8)	2 (4.9)	1 (2.4)		1 (2.4)			41 (100.0)	2	43	8.88	0.79
500～ (%)		1 (1.9)	5 (9.3)	5 (9.3)	2 (3.7)	8 (14.8)	17 (31.5)	8 (14.8)		5 (9.3)	2 (3.7)			1 (1.9)	54 (100.0)		54	9.13	0.90
540～ (%)		1 (1.4)	7 (9.9)	14 (19.7)	4 (5.6)	11 (15.5)	16 (22.5)	9 (12.7)	2 (2.8)	4 (5.6)	3 (4.2)				71 (100.0)	2	73	8.90	0.85
600～ (%)		2 (1.9)	7 (6.7)	10 (9.6)	3 (2.9)	18 (17.3)	23 (22.1)	23 (22.1)		9 (8.7)	6 (5.8)		3 (2.9)		104 (100.0)	1	105	9.19	0.90
800～ (%)	1 (0.9)	5 (4.6)	8 (7.4)	5 (4.6)	5 (4.6)	19 (17.6)	19 (17.6)	32 (29.6)	4 (3.7)	3 (2.8)	3 (2.8)	4 (3.7)			108 (100.0)	2	110	9.12	0.91
合計 (%)	19 (0.4)	28 (0.6)	104 (2.3)	217 (4.8)	69 (1.5)	695 (15.2)	1,218 (26.7)	1,261 (27.6)	147 (3.2)	443 (9.7)	233 (5.1)	84 (1.8)	21 (0.5)	23 (0.5)	4,562 (100.0)	66	4,628	9.41	0.80
記載なし (%)	1 (0.5)	2 (1.0)	3 (1.6)	6 (3.1)	1 (0.5)	22 (11.4)	56 (29.0)	60 (31.1)	10 (5.2)	17 (8.8)	8 (4.1)	1 (0.5)	4 (2.1)	2 (1.0)	193 (100.0)	183	376	9.50	0.80
総計 (%)	20 (0.4)	30 (0.6)	107 (2.3)	223 (4.7)	70 (1.5)	717 (15.1)	1,274 (26.8)	1,321 (27.8)	157 (3.3)	460 (9.7)	241 (5.1)	85 (1.8)	25 (0.5)	25 (0.5)	4,755 (100.0)	249	5,004	9.41	0.80
平均	416.84	460.57	397.87	304.06	331.46	253.55	227.12	205.38	190.12	162.24	162.97	178.58	216.05	93.87	224.10	208.05	223.88		
標準偏差	816.76	292.25	349.29	221.61	253.50	233.77	193.16	229.05	220.48	183.04	182.84	277.60	224.02	127.87	229.71	200.31	229.31		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査