

表 3437 透析前リン濃度(mg/dL) 治療方法別（透析患者全体）

治療方法	3未満	3.0～	3.5～	4.0～	4.5～	5.0～	5.5～	6.0～	6.1～	6.5～	7.0～	7.5～	8.0～	8.5～	9.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
施設血液透析 （%）	9,509 (4.1)	11,580 (5.0)	20,015 (8.6)	29,543 (12.8)	34,905 (15.1)	35,151 (15.2)	30,141 (13.0)	5,109 (2.2)	17,156 (7.4)	14,905 (6.4)	9,199 (4.0)	5,539 (2.4)	3,298 (1.4)	2,084 (0.9)	3,276 (1.4)	231,410 (100.0)	24,231	255,641	5.19	1.43
血液透析濾過 （%）	1,167 (2.9)	1,623 (4.1)	2,942 (7.4)	4,700 (11.8)	5,879 (14.7)	6,293 (15.7)	5,439 (13.6)	970 (2.4)	3,320 (8.3)	2,877 (7.2)	1,814 (4.5)	1,135 (2.8)	670 (1.7)	435 (1.1)	701 (1.8)	39,965 (100.0)	3,318	43,283	5.35	1.43
血液濾過 （%）	6 (6.6)	3 (3.3)	7 (7.7)	11 (12.1)	10 (11.0)	16 (17.6)	14 (15.4)	1 (1.1)	8 (8.8)	5 (5.5)	3 (3.3)	3 (3.3)	1 (1.1)	1 (1.1)	2 (2.2)	91 (100.0)	1	92	5.19	1.59
血液吸着透析 （%）	42 (2.7)	76 (4.9)	134 (8.6)	205 (13.1)	283 (18.1)	252 (16.1)	238 (15.2)	38 (2.4)	127 (8.1)	77 (4.9)	39 (2.5)	28 (1.8)	7 (0.4)	11 (0.7)	7 (0.4)	1,564 (100.0)	66	1,630	5.09	1.18
在宅血液透析 （%）	36 (9.1)	30 (7.6)	59 (14.9)	53 (13.4)	61 (15.4)	58 (14.6)	34 (8.6)	5 (1.3)	21 (5.3)	15 (3.8)	10 (2.5)	4 (1.0)	6 (1.5)	3 (0.8)	2 (0.5)	397 (100.0)	124	521	4.70	1.38
腹膜透析 （%）	126 (2.1)	270 (4.5)	525 (8.8)	770 (12.9)	921 (15.4)	948 (15.9)	839 (14.0)	138 (2.3)	477 (8.0)	399 (6.7)	212 (3.5)	149 (2.5)	71 (1.2)	38 (0.6)	89 (1.5)	5,972 (100.0)	2,969	8,941	5.25	1.35
合計 （%）	10,886 (3.9)	13,582 (4.9)	23,682 (8.5)	35,282 (12.6)	42,059 (15.1)	42,718 (15.3)	36,705 (13.1)	6,261 (2.2)	21,109 (7.6)	18,278 (6.5)	11,277 (4.0)	6,858 (2.5)	4,053 (1.5)	2,572 (0.9)	4,077 (1.5)	279,399 (100.0)	30,709	310,108	5.21	1.43
記載なし （%）																				
総計 （%）	10,886 (3.9)	13,582 (4.9)	23,682 (8.5)	35,282 (12.6)	42,059 (15.1)	42,718 (15.3)	36,705 (13.1)	6,261 (2.2)	21,109 (7.6)	18,278 (6.5)	11,277 (4.0)	6,858 (2.5)	4,053 (1.5)	2,572 (0.9)	4,077 (1.5)	279,399 (100.0)	30,709	310,108	5.21	1.43

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査