

表 3440 透析前リン濃度(mg/dL) 性別 (透析患者全体)

性別	3未満	3.0～	3.5～	4.0～	4.5～	5.0～	5.5～	6.0～	6.1～	6.5～	7.0～	7.5～	8.0～	8.5～	9.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性 (%)	6,609 (3.7)	8,645 (4.8)	15,075 (8.4)	22,312 (12.5)	26,440 (14.8)	26,957 (15.1)	23,367 (13.1)	4,006 (2.2)	13,726 (7.7)	12,040 (6.7)	7,502 (4.2)	4,580 (2.6)	2,782 (1.6)	1,778 (1.0)	2,808 (1.6)	178,627 (100.0)	19,514	198,141	5.24	1.44
女性 (%)	4,277 (4.2)	4,937 (4.9)	8,607 (8.5)	12,970 (12.9)	15,619 (15.5)	15,761 (15.6)	13,338 (13.2)	2,255 (2.2)	7,383 (7.3)	6,238 (6.2)	3,775 (3.7)	2,278 (2.3)	1,271 (1.3)	794 (0.8)	1,269 (1.3)	100,772 (100.0)	11,195	111,967	5.16	1.40
合計 (%)	10,886 (3.9)	13,582 (4.9)	23,682 (8.5)	35,282 (12.6)	42,059 (15.1)	42,718 (15.3)	36,705 (13.1)	6,261 (2.2)	21,109 (7.6)	18,278 (6.5)	11,277 (4.0)	6,858 (2.5)	4,053 (1.5)	2,572 (0.9)	4,077 (1.5)	279,399 (100.0)	30,709	310,108	5.21	1.43
記載なし (%)																				
総計 (%)	10,886 (3.9)	13,582 (4.9)	23,682 (8.5)	35,282 (12.6)	42,059 (15.1)	42,718 (15.3)	36,705 (13.1)	6,261 (2.2)	21,109 (7.6)	18,278 (6.5)	11,277 (4.0)	6,858 (2.5)	4,053 (1.5)	2,572 (0.9)	4,077 (1.5)	279,399 (100.0)	30,709	310,108	5.21	1.43

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査