

表 3449 透析前リン濃度(mg/dL) 総コレステロール濃度(mg/dL)別（透析患者全体）

総コレステロール濃度	3未満	3.0～	3.5～	4.0～	4.5～	5.0～	5.5～	6.0～	6.1～	6.5～	7.0～	7.5～	8.0～	8.5～	9.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
100未満 (%)	711 (9.1)	558 (7.2)	871 (11.2)	1,124 (14.4)	1,165 (14.9)	1,025 (13.1)	867 (11.1)	143 (1.8)	412 (5.3)	368 (4.7)	219 (2.8)	129 (1.7)	85 (1.1)	48 (0.6)	74 (0.9)	7,799 (100.0)	31	7,830	4.79	1.48
100～ (%)	1,287 (5.7)	1,402 (6.2)	2,258 (10.0)	3,103 (13.7)	3,391 (15.0)	3,299 (14.6)	2,783 (12.3)	441 (1.9)	1,501 (6.6)	1,238 (5.5)	809 (3.6)	453 (2.0)	276 (1.2)	161 (0.7)	267 (1.2)	22,669 (100.0)	53	22,722	5.02	1.43
120～ (%)	1,789 (4.2)	2,235 (5.3)	3,807 (9.0)	5,653 (13.4)	6,548 (15.5)	6,495 (15.4)	5,352 (12.7)	892 (2.1)	3,008 (7.1)	2,548 (6.0)	1,574 (3.7)	911 (2.2)	540 (1.3)	322 (0.8)	461 (1.1)	42,135 (100.0)	66	42,201	5.12	1.39
140～ (%)	1,674 (3.4)	2,302 (4.7)	4,068 (8.4)	6,122 (12.6)	7,436 (15.3)	7,493 (15.4)	6,498 (13.4)	1,140 (2.3)	3,733 (7.7)	3,154 (6.5)	1,969 (4.1)	1,174 (2.4)	724 (1.5)	406 (0.8)	675 (1.4)	48,568 (100.0)	91	48,659	5.23	1.40
160～ (%)	1,145 (2.8)	1,752 (4.4)	3,211 (8.0)	4,930 (12.3)	6,159 (15.3)	6,238 (15.5)	5,427 (13.5)	917 (2.3)	3,255 (8.1)	2,812 (7.0)	1,698 (4.2)	994 (2.5)	606 (1.5)	422 (1.1)	620 (1.5)	40,186 (100.0)	57	40,243	5.29	1.40
180～ (%)	697 (2.7)	992 (3.9)	1,911 (7.5)	3,037 (11.9)	3,798 (14.9)	4,101 (16.1)	3,481 (13.7)	622 (2.4)	2,101 (8.2)	1,822 (7.1)	1,163 (4.6)	724 (2.8)	374 (1.5)	251 (1.0)	423 (1.7)	25,497 (100.0)	28	25,525	5.34	1.40
200～ (%)	374 (2.7)	507 (3.7)	1,023 (7.5)	1,568 (11.4)	1,926 (14.1)	2,131 (15.6)	1,901 (13.9)	371 (2.7)	1,110 (8.1)	1,059 (7.7)	647 (4.7)	419 (3.1)	259 (1.9)	156 (1.1)	244 (1.8)	13,695 (100.0)	28	13,723	5.40	1.44
220～ (%)	185 (3.1)	223 (3.7)	433 (7.1)	690 (11.4)	823 (13.6)	905 (14.9)	856 (14.1)	148 (2.4)	497 (8.2)	472 (7.8)	306 (5.0)	199 (3.3)	117 (1.9)	59 (1.0)	147 (2.4)	6,060 (100.0)	11	6,071	5.44	1.49
240～ (%)	70 (2.9)	90 (3.8)	192 (8.0)	263 (11.0)	380 (15.9)	350 (14.6)	313 (13.1)	49 (2.0)	179 (7.5)	164 (6.8)	118 (4.9)	79 (3.3)	48 (2.0)	35 (1.5)	66 (2.8)	2,396 (100.0)	4	2,400	5.42	1.56
260～ (%)	51 (3.2)	69 (4.4)	131 (8.3)	145 (9.2)	195 (12.4)	217 (13.8)	214 (13.6)	41 (2.6)	133 (8.4)	135 (8.6)	84 (5.3)	45 (2.9)	41 (2.6)	24 (1.5)	52 (3.3)	1,577 (100.0)	9	1,586	5.52	1.61
合計 (%)	7,983 (3.8)	10,130 (4.8)	17,905 (8.5)	26,635 (12.6)	31,821 (15.1)	32,254 (15.3)	27,692 (13.2)	4,764 (2.3)	15,929 (7.6)	13,772 (6.5)	8,587 (4.1)	5,127 (2.4)	3,070 (1.5)	1,884 (0.9)	3,029 (1.4)	210,582 (100.0)	378	210,960	5.22	1.42
記載なし (%)	2,903 (4.2)	3,452 (5.0)	5,777 (8.4)	8,647 (12.6)	10,238 (14.9)	10,464 (15.2)	9,013 (13.1)	1,497 (2.2)	5,180 (7.5)	4,506 (6.5)	2,690 (3.9)	1,731 (2.5)	983 (1.4)	688 (1.0)	1,048 (1.5)	68,817 (100.0)	30,331	99,148	5.21	1.44
総計 (%)	10,886 (3.9)	13,582 (4.9)	23,682 (8.5)	35,282 (12.6)	42,059 (15.1)	42,718 (15.3)	36,705 (13.1)	6,261 (2.2)	21,109 (7.6)	18,278 (6.5)	11,277 (4.0)	6,858 (2.5)	4,053 (1.5)	2,572 (0.9)	4,077 (1.5)	279,399 (100.0)	30,709	310,108	5.21	1.43
平均	145.47	150.01	152.43	153.50	155.21	156.54	157.33	158.62	158.63	159.76	159.92	161.04	160.98	161.93	164.42	155.87	152.50	155.86		
標準偏差	37.74	35.57	36.02	35.09	34.96	34.99	35.33	35.28	35.08	35.79	36.36	36.50	37.57	36.78	39.41	35.72	42.24	35.74		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査