

表 3455 透析前リン濃度(mg/dL) 性別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

性別	3未満	3.0～	3.5～	4.0～	4.5～	5.0～	5.5～	6.0～	6.1～	6.5～	7.0～	7.5～	8.0～	8.5～	9.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性 (%)	5,468 (3.8)	7,045 (4.9)	12,179 (8.5)	17,915 (12.6)	21,144 (14.8)	21,505 (15.1)	18,559 (13.0)	3,196 (2.2)	10,783 (7.6)	9,509 (6.7)	5,882 (4.1)	3,583 (2.5)	2,192 (1.5)	1,389 (1.0)	2,162 (1.5)	142,511 (100.0)	4,522	147,033	5.23	1.44
女性 (%)	3,493 (4.4)	3,935 (5.0)	6,839 (8.6)	10,277 (13.0)	12,324 (15.5)	12,304 (15.5)	10,453 (13.2)	1,732 (2.2)	5,722 (7.2)	4,868 (6.1)	2,978 (3.8)	1,776 (2.2)	1,000 (1.3)	634 (0.8)	994 (1.3)	79,329 (100.0)	2,609	81,938	5.14	1.40
合計 (%)	8,961 (4.0)	10,980 (4.9)	19,018 (8.6)	28,192 (12.7)	33,468 (15.1)	33,809 (15.2)	29,012 (13.1)	4,928 (2.2)	16,505 (7.4)	14,377 (6.5)	8,860 (4.0)	5,359 (2.4)	3,192 (1.4)	2,023 (0.9)	3,156 (1.4)	221,840 (100.0)	7,131	228,971	5.20	1.43
記載なし (%)																				
総計 (%)	8,961 (4.0)	10,980 (4.9)	19,018 (8.6)	28,192 (12.7)	33,468 (15.1)	33,809 (15.2)	29,012 (13.1)	4,928 (2.2)	16,505 (7.4)	14,377 (6.5)	8,860 (4.0)	5,359 (2.4)	3,192 (1.4)	2,023 (0.9)	3,156 (1.4)	221,840 (100.0)	7,131	228,971	5.20	1.43

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査