

表 3464 透析前リン濃度(mg/dL) 総コレステロール濃度(mg/dL)別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

総コレステロール濃度	3未満	3.0～	3.5～	4.0～	4.5～	5.0～	5.5～	6.0～	6.1～	6.5～	7.0～	7.5～	8.0～	8.5～	9.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
100未満 (%)	597 (9.3)	470 (7.3)	715 (11.1)	940 (14.6)	945 (14.7)	852 (13.3)	720 (11.2)	120 (1.9)	335 (5.2)	290 (4.5)	174 (2.7)	105 (1.6)	66 (1.0)	41 (0.6)	57 (0.9)	6,427 (100.0)	27	6,454	4.78	1.48
100～ (%)	1,087 (5.9)	1,190 (6.4)	1,896 (10.2)	2,545 (13.7)	2,786 (15.0)	2,683 (14.4)	2,246 (12.1)	362 (1.9)	1,226 (6.6)	977 (5.3)	663 (3.6)	362 (1.9)	219 (1.2)	128 (0.7)	209 (1.1)	18,579 (100.0)	41	18,620	5.00	1.43
120～ (%)	1,508 (4.4)	1,836 (5.4)	3,160 (9.2)	4,647 (13.6)	5,273 (15.4)	5,301 (15.5)	4,324 (12.6)	732 (2.1)	2,400 (7.0)	2,052 (6.0)	1,249 (3.6)	724 (2.1)	444 (1.3)	257 (0.8)	359 (1.0)	34,266 (100.0)	49	34,315	5.10	1.38
140～ (%)	1,369 (3.5)	1,847 (4.8)	3,286 (8.5)	4,884 (12.6)	5,974 (15.4)	6,000 (15.5)	5,195 (13.4)	935 (2.4)	2,942 (7.6)	2,492 (6.4)	1,527 (3.9)	903 (2.3)	573 (1.5)	309 (0.8)	527 (1.4)	38,763 (100.0)	63	38,826	5.21	1.39
160～ (%)	934 (3.0)	1,423 (4.5)	2,550 (8.1)	3,912 (12.4)	4,832 (15.3)	4,901 (15.5)	4,239 (13.4)	705 (2.2)	2,492 (7.9)	2,156 (6.8)	1,336 (4.2)	795 (2.5)	472 (1.5)	325 (1.0)	473 (1.5)	31,545 (100.0)	38	31,583	5.28	1.40
180～ (%)	560 (2.9)	773 (3.9)	1,480 (7.5)	2,341 (11.9)	2,928 (14.9)	3,154 (16.1)	2,688 (13.7)	463 (2.4)	1,601 (8.2)	1,394 (7.1)	884 (4.5)	551 (2.8)	266 (1.4)	201 (1.0)	320 (1.6)	19,604 (100.0)	15	19,619	5.33	1.40
200～ (%)	266 (2.6)	368 (3.6)	751 (7.4)	1,165 (11.4)	1,456 (14.3)	1,588 (15.6)	1,395 (13.7)	272 (2.7)	827 (8.1)	786 (7.7)	502 (4.9)	314 (3.1)	196 (1.9)	120 (1.2)	188 (1.8)	10,194 (100.0)	15	10,209	5.41	1.45
220～ (%)	148 (3.3)	167 (3.7)	313 (7.0)	509 (11.4)	624 (14.0)	649 (14.5)	603 (13.5)	102 (2.3)	377 (8.4)	344 (7.7)	233 (5.2)	146 (3.3)	95 (2.1)	45 (1.0)	113 (2.5)	4,468 (100.0)	7	4,475	5.44	1.52
240～ (%)	53 (3.1)	69 (4.0)	128 (7.4)	194 (11.2)	270 (15.6)	240 (13.9)	234 (13.5)	34 (2.0)	133 (7.7)	114 (6.6)	93 (5.4)	60 (3.5)	36 (2.1)	26 (1.5)	46 (2.7)	1,730 (100.0)	3	1,733	5.43	1.58
260～ (%)	40 (3.6)	45 (4.1)	83 (7.5)	106 (9.6)	132 (11.9)	155 (14.0)	149 (13.5)	20 (1.8)	91 (8.2)	108 (9.8)	59 (5.3)	31 (2.8)	31 (2.8)	15 (1.4)	41 (3.7)	1,106 (100.0)	5	1,111	5.56	1.63
合計 (%)	6,562 (3.9)	8,188 (4.9)	14,362 (8.6)	21,243 (12.7)	25,220 (15.1)	25,523 (15.3)	21,793 (13.1)	3,745 (2.2)	12,424 (7.5)	10,713 (6.4)	6,720 (4.0)	3,991 (2.4)	2,398 (1.4)	1,467 (0.9)	2,333 (1.4)	166,682 (100.0)	263	166,945	5.20	1.42
記載なし (%)	2,399 (4.3)	2,792 (5.1)	4,656 (8.4)	6,949 (12.6)	8,248 (15.0)	8,286 (15.0)	7,219 (13.1)	1,183 (2.1)	4,081 (7.4)	3,664 (6.6)	2,140 (3.9)	1,368 (2.5)	794 (1.4)	556 (1.0)	823 (1.5)	55,158 (100.0)	6,868	62,026	5.20	1.45
総計 (%)	8,961 (4.0)	10,980 (4.9)	19,018 (8.6)	28,192 (12.7)	33,468 (15.1)	33,809 (15.2)	29,012 (13.1)	4,928 (2.2)	16,505 (7.4)	14,377 (6.5)	8,860 (4.0)	5,359 (2.4)	3,192 (1.4)	2,023 (0.9)	3,156 (1.4)	221,840 (100.0)	7,131	228,971	5.20	1.43
平均	144.47	148.64	150.91	152.40	154.22	155.35	156.18	156.75	157.65	158.96	159.26	160.39	160.23	161.16	163.95	154.73	147.82	154.71		
標準偏差	37.33	34.96	35.19	34.70	34.50	34.43	34.89	34.25	34.78	35.46	36.09	36.26	37.40	36.56	39.09	35.27	41.18	35.28		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査