

表 3470 透析前リン濃度(mg/dL) 性別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

性別	3未満	3.0～	3.5～	4.0～	4.5～	5.0～	5.5～	6.0～	6.1～	6.5～	7.0～	7.5～	8.0～	8.5～	9.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性 (%)	656 (2.7)	960 (3.9)	1,744 (7.1)	2,862 (11.7)	3,531 (14.4)	3,766 (15.3)	3,330 (13.6)	581 (2.4)	2,096 (8.5)	1,839 (7.5)	1,191 (4.9)	742 (3.0)	454 (1.9)	300 (1.2)	487 (2.0)	24,539 (100.0)	655	25,194	5.41	1.45
女性 (%)	477 (3.3)	614 (4.3)	1,105 (7.7)	1,703 (11.9)	2,181 (15.2)	2,368 (16.5)	1,969 (13.7)	369 (2.6)	1,148 (8.0)	967 (6.7)	584 (4.1)	362 (2.5)	197 (1.4)	123 (0.9)	195 (1.4)	14,362 (100.0)	390	14,752	5.27	1.38
合計 (%)	1,133 (2.9)	1,574 (4.0)	2,849 (7.3)	4,565 (11.7)	5,712 (14.7)	6,134 (15.8)	5,299 (13.6)	950 (2.4)	3,244 (8.3)	2,806 (7.2)	1,775 (4.6)	1,104 (2.8)	651 (1.7)	423 (1.1)	682 (1.8)	38,901 (100.0)	1,045	39,946	5.36	1.43
記載なし (%)																				
総計 (%)	1,133 (2.9)	1,574 (4.0)	2,849 (7.3)	4,565 (11.7)	5,712 (14.7)	6,134 (15.8)	5,299 (13.6)	950 (2.4)	3,244 (8.3)	2,806 (7.2)	1,775 (4.6)	1,104 (2.8)	651 (1.7)	423 (1.1)	682 (1.8)	38,901 (100.0)	1,045	39,946	5.36	1.43

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査