

表 3475 透析前リン濃度(mg/dL) 透析後体重(kg)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

透析後体重	3未満	3.0～	3.5～	4.0～	4.5～	5.0～	5.5～	6.0～	6.1～	6.5～	7.0～	7.5～	8.0～	8.5～	9.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)			1 (8.3)	1 (8.3)	2 (16.7)	3 (25.0)	2 (16.7)		1 (8.3)		1 (8.3)	1 (8.3)				12 (100.0)		12	5.50	1.15
20～ (%)	6 (8.2)	4 (5.5)	7 (9.6)	6 (8.2)	10 (13.7)	12 (16.4)	7 (9.6)	2 (2.7)	6 (8.2)	5 (6.8)	4 (5.5)	1 (1.4)		1 (1.4)	2 (2.7)	73 (100.0)	3	76	5.12	1.61
30～ (%)	162 (6.1)	150 (5.7)	252 (9.5)	348 (13.1)	394 (14.9)	393 (14.8)	339 (12.8)	63 (2.4)	180 (6.8)	143 (5.4)	93 (3.5)	53 (2.0)	34 (1.3)	21 (0.8)	28 (1.1)	2,653 (100.0)	29	2,682	5.03	1.43
40～ (%)	359 (3.6)	481 (4.9)	873 (8.8)	1,298 (13.1)	1,532 (15.5)	1,616 (16.3)	1,291 (13.0)	262 (2.6)	748 (7.6)	589 (5.9)	360 (3.6)	195 (2.0)	119 (1.2)	70 (0.7)	109 (1.1)	9,902 (100.0)	103	10,005	5.15	1.34
50～ (%)	348 (2.8)	530 (4.3)	932 (7.5)	1,478 (11.9)	1,843 (14.9)	1,938 (15.7)	1,697 (13.7)	276 (2.2)	1,047 (8.5)	891 (7.2)	536 (4.3)	361 (2.9)	206 (1.7)	114 (0.9)	182 (1.5)	12,379 (100.0)	111	12,490	5.33	1.40
60～ (%)	174 (2.1)	286 (3.4)	512 (6.2)	919 (11.1)	1,266 (15.2)	1,335 (16.1)	1,139 (13.7)	204 (2.5)	713 (8.6)	662 (8.0)	422 (5.1)	263 (3.2)	145 (1.7)	106 (1.3)	162 (1.9)	8,308 (100.0)	57	8,365	5.46	1.41
70～ (%)	57 (1.7)	83 (2.4)	188 (5.5)	336 (9.9)	414 (12.2)	559 (16.4)	496 (14.6)	87 (2.6)	318 (9.3)	303 (8.9)	203 (6.0)	130 (3.8)	80 (2.3)	53 (1.6)	100 (2.9)	3,407 (100.0)	16	3,423	5.66	1.46
80～ (%)	15 (1.2)	26 (2.1)	53 (4.2)	110 (8.7)	147 (11.6)	168 (13.3)	196 (15.5)	28 (2.2)	137 (10.8)	126 (10.0)	89 (7.0)	58 (4.6)	32 (2.5)	27 (2.1)	52 (4.1)	1,264 (100.0)	9	1,273	5.88	1.53
90～ (%)	1 (0.2)	5 (1.1)	19 (4.2)	31 (6.8)	47 (10.4)	60 (13.2)	69 (15.2)	14 (3.1)	43 (9.5)	47 (10.4)	39 (8.6)	21 (4.6)	19 (4.2)	15 (3.3)	24 (5.3)	454 (100.0)	1	455	6.15	1.63
100～ (%)	3 (2.1)		1 (0.7)	11 (7.7)	16 (11.3)	14 (9.9)	20 (14.1)	2 (1.4)	19 (13.4)	11 (7.7)	14 (9.9)	11 (7.7)	6 (4.2)	7 (4.9)	7 (4.9)	142 (100.0)		142	6.25	1.62
110～ (%)	1 (1.6)	1 (1.6)		2 (3.3)	12 (19.7)	6 (9.8)	7 (11.5)	2 (3.3)	5 (8.2)	9 (14.8)	1 (1.6)	2 (3.3)	2 (3.3)	4 (6.6)	7 (11.5)	61 (100.0)		61	6.36	1.82
120～ (%)				1 (2.7)	4 (10.8)	2 (5.4)	4 (10.8)	5 (13.5)	5 (13.5)	4 (10.8)	4 (10.8)	3 (8.1)	2 (5.4)		3 (8.1)	37 (100.0)		37	6.51	1.44
合計 (%)	1,126 (2.9)	1,566 (4.0)	2,838 (7.3)	4,541 (11.7)	5,687 (14.7)	6,106 (15.8)	5,267 (13.6)	945 (2.4)	3,222 (8.3)	2,790 (7.2)	1,766 (4.6)	1,099 (2.8)	645 (1.7)	418 (1.1)	676 (1.7)	38,692 (100.0)	329	39,021	5.35	1.42
記載なし (%)	7 (3.3)	8 (3.8)	11 (5.3)	24 (11.5)	25 (12.0)	28 (13.4)	32 (15.3)	5 (2.4)	22 (10.5)	16 (7.7)	9 (4.3)	5 (2.4)	6 (2.9)	5 (2.4)	6 (2.9)	209 (100.0)	716	925	5.56	1.55
総計 (%)	1,133 (2.9)	1,574 (4.0)	2,849 (7.3)	4,565 (11.7)	5,712 (14.7)	6,134 (15.8)	5,299 (13.6)	950 (2.4)	3,244 (8.3)	2,806 (7.2)	1,775 (4.6)	1,104 (2.8)	651 (1.7)	423 (1.1)	682 (1.8)	38,901 (100.0)	1,045	39,946	5.36	1.43
平均	51.92	53.41	54.01	55.16	55.91	56.34	57.16	57.06	57.92	58.80	59.46	60.07	60.37	62.13	63.09	56.65	53.43	56.63		
標準偏差	11.88	10.97	11.56	12.00	12.42	12.46	13.14	14.20	13.47	13.58	14.18	14.20	14.93	15.56	16.51	13.04	11.51	13.03		

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査