

表 3479 透析前リン濃度(mg/dL) 総コレステロール濃度(mg/dL)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

総コレステロール濃度	3未満	3.0～	3.5～	4.0～	4.5～	5.0～	5.5～	6.0～	6.1～	6.5～	7.0～	7.5～	8.0～	8.5～	9.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
100未満 (%)	72 (7.3)	58 (5.9)	114 (11.5)	139 (14.0)	153 (15.4)	120 (12.1)	115 (11.6)	19 (1.9)	52 (5.2)	64 (6.5)	34 (3.4)	20 (2.0)	14 (1.4)	4 (0.4)	13 (1.3)	991 (100.0)	1	992	4.93	1.49
100～ (%)	128 (4.3)	159 (5.3)	243 (8.1)	401 (13.4)	430 (14.4)	442 (14.8)	395 (13.2)	55 (1.8)	219 (7.3)	209 (7.0)	117 (3.9)	68 (2.3)	46 (1.5)	29 (1.0)	41 (1.4)	2,982 (100.0)	6	2,988	5.19	1.44
120～ (%)	181 (3.2)	278 (4.9)	459 (8.1)	702 (12.3)	891 (15.7)	871 (15.3)	741 (13.0)	121 (2.1)	455 (8.0)	374 (6.6)	256 (4.5)	148 (2.6)	83 (1.5)	47 (0.8)	81 (1.4)	5,688 (100.0)	6	5,694	5.25	1.40
140～ (%)	201 (2.9)	289 (4.2)	493 (7.1)	833 (12.1)	1,014 (14.7)	1,085 (15.7)	930 (13.5)	145 (2.1)	576 (8.3)	487 (7.1)	323 (4.7)	205 (3.0)	119 (1.7)	80 (1.2)	121 (1.8)	6,901 (100.0)	4	6,905	5.36	1.44
160～ (%)	130 (2.2)	203 (3.4)	421 (7.0)	669 (11.1)	917 (15.3)	939 (15.6)	839 (14.0)	151 (2.5)	552 (9.2)	482 (8.0)	267 (4.4)	151 (2.5)	103 (1.7)	75 (1.2)	110 (1.8)	6,009 (100.0)	2	6,011	5.42	1.40
180～ (%)	84 (2.2)	120 (3.1)	245 (6.3)	425 (11.0)	549 (14.2)	628 (16.2)	532 (13.7)	114 (2.9)	345 (8.9)	304 (7.9)	204 (5.3)	126 (3.3)	82 (2.1)	36 (0.9)	78 (2.0)	3,872 (100.0)	1	3,873	5.48	1.42
200～ (%)	54 (2.4)	80 (3.6)	142 (6.3)	233 (10.4)	296 (13.1)	357 (15.9)	342 (15.2)	64 (2.8)	194 (8.6)	197 (8.8)	108 (4.8)	71 (3.2)	46 (2.0)	30 (1.3)	37 (1.6)	2,251 (100.0)	2	2,253	5.48	1.40
220～ (%)	17 (1.8)	27 (2.8)	59 (6.2)	100 (10.5)	115 (12.0)	152 (15.9)	151 (15.8)	32 (3.3)	81 (8.5)	91 (9.5)	47 (4.9)	38 (4.0)	13 (1.4)	10 (1.0)	23 (2.4)	956 (100.0)		956	5.56	1.40
240～ (%)	7 (1.8)	11 (2.9)	36 (9.4)	33 (8.6)	60 (15.6)	64 (16.7)	45 (11.7)	10 (2.6)	25 (6.5)	32 (8.3)	17 (4.4)	10 (2.6)	11 (2.9)	7 (1.8)	16 (4.2)	384 (100.0)		384	5.57	1.58
260～ (%)	5 (2.3)	8 (3.7)	12 (5.6)	23 (10.6)	24 (11.1)	28 (13.0)	37 (17.1)	11 (5.1)	16 (7.4)	9 (4.2)	11 (5.1)	9 (4.2)	7 (3.2)	8 (3.7)	8 (3.7)	216 (100.0)		216	5.70	1.64
合計 (%)	879 (2.9)	1,233 (4.1)	2,224 (7.4)	3,558 (11.8)	4,449 (14.7)	4,686 (15.5)	4,127 (13.6)	722 (2.4)	2,515 (8.3)	2,249 (7.4)	1,384 (4.6)	846 (2.8)	524 (1.7)	326 (1.1)	528 (1.7)	30,250 (100.0)	22	30,272	5.36	1.43
記載なし (%)	254 (2.9)	341 (3.9)	625 (7.2)	1,007 (11.6)	1,263 (14.6)	1,448 (16.7)	1,172 (13.5)	228 (2.6)	729 (8.4)	557 (6.4)	391 (4.5)	258 (3.0)	127 (1.5)	97 (1.1)	154 (1.8)	8,651 (100.0)	1,023	9,674	5.35	1.42
総計 (%)	1,133 (2.9)	1,574 (4.0)	2,849 (7.3)	4,565 (11.7)	5,712 (14.7)	6,134 (15.8)	5,299 (13.6)	950 (2.4)	3,244 (8.3)	2,806 (7.2)	1,775 (4.6)	1,104 (2.8)	651 (1.7)	423 (1.1)	682 (1.8)	38,901 (100.0)	1,045	39,946	5.36	1.43
平均	147.38	151.93	154.36	155.04	156.75	159.02	159.72	163.73	160.12	160.80	160.25	161.39	162.14	164.70	164.72	158.02	140.55	158.00		
標準偏差	36.78	35.43	36.20	35.54	34.71	35.15	35.67	36.84	34.24	36.01	35.28	36.43	37.68	37.43	38.42	35.69	33.36	35.70		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査