

表 3482 透析前リン濃度(mg/dL) 透析前収縮期血圧(mmHg)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

透析前収縮期血圧	3未満	3.0～	3.5～	4.0～	4.5～	5.0～	5.5～	6.0～	6.1～	6.5～	7.0～	7.5～	8.0～	8.5～	9.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
60未満 (%)										1 (50.0)					1 (50.0)	2 (100.0)		2	8.60	2.40
60～ (%)	4 (3.5)	8 (7.1)	7 (6.2)	8 (7.1)	16 (14.2)	15 (13.3)	11 (9.7)	4 (3.5)	12 (10.6)	9 (8.0)	6 (5.3)	6 (5.3)	3 (2.7)		4 (3.5)	113 (100.0)	2	115	5.50	1.68
80～ (%)	34 (5.6)	34 (5.6)	50 (8.3)	81 (13.5)	85 (14.1)	95 (15.8)	67 (11.1)	14 (2.3)	48 (8.0)	38 (6.3)	21 (3.5)	12 (2.0)	12 (2.0)	3 (0.5)	8 (1.3)	602 (100.0)	13	615	5.11	1.44
100～ (%)	117 (4.2)	119 (4.3)	221 (8.0)	329 (11.9)	412 (14.9)	442 (15.9)	348 (12.6)	78 (2.8)	221 (8.0)	199 (7.2)	112 (4.0)	75 (2.7)	34 (1.2)	25 (0.9)	40 (1.4)	2,772 (100.0)	28	2,800	5.25	1.43
120～ (%)	220 (2.9)	319 (4.2)	561 (7.4)	895 (11.8)	1,072 (14.1)	1,257 (16.6)	1,101 (14.5)	196 (2.6)	591 (7.8)	523 (6.9)	329 (4.3)	220 (2.9)	123 (1.6)	67 (0.9)	113 (1.5)	7,587 (100.0)	52	7,639	5.32	1.38
140～ (%)	303 (2.7)	470 (4.1)	830 (7.3)	1,364 (12.0)	1,723 (15.2)	1,755 (15.5)	1,587 (14.0)	262 (2.3)	980 (8.6)	802 (7.1)	514 (4.5)	271 (2.4)	171 (1.5)	131 (1.2)	184 (1.6)	11,347 (100.0)	86	11,433	5.34	1.39
160～ (%)	231 (2.8)	323 (3.9)	591 (7.1)	914 (11.1)	1,233 (14.9)	1,302 (15.7)	1,108 (13.4)	202 (2.4)	701 (8.5)	639 (7.7)	389 (4.7)	256 (3.1)	141 (1.7)	90 (1.1)	150 (1.8)	8,270 (100.0)	38	8,308	5.39	1.43
180～ (%)	76 (2.4)	115 (3.7)	207 (6.6)	366 (11.6)	418 (13.3)	467 (14.9)	408 (13.0)	67 (2.1)	279 (8.9)	269 (8.6)	167 (5.3)	102 (3.2)	79 (2.5)	44 (1.4)	80 (2.5)	3,144 (100.0)	10	3,154	5.52	1.52
200～ (%)	14 (1.7)	24 (2.9)	64 (7.8)	91 (11.1)	114 (13.9)	132 (16.1)	106 (12.9)	18 (2.2)	66 (8.1)	55 (6.7)	55 (6.7)	30 (3.7)	16 (2.0)	10 (1.2)	24 (2.9)	819 (100.0)	3	822	5.54	1.49
220～ (%)	10 (4.6)	1 (0.5)	22 (10.2)	19 (8.8)	28 (13.0)	21 (9.7)	32 (14.8)	2 (0.9)	15 (6.9)	23 (10.6)	11 (5.1)	11 (5.1)	8 (3.7)	3 (1.4)	10 (4.6)	216 (100.0)		216	5.68	1.76
合計 (%)	1,009 (2.9)	1,413 (4.1)	2,553 (7.3)	4,067 (11.7)	5,101 (14.6)	5,486 (15.7)	4,768 (13.7)	843 (2.4)	2,913 (8.4)	2,558 (7.3)	1,604 (4.6)	983 (2.8)	587 (1.7)	373 (1.1)	614 (1.8)	34,872 (100.0)	232	35,104	5.36	1.43
記載なし (%)	124 (3.1)	161 (4.0)	296 (7.3)	498 (12.4)	611 (15.2)	648 (16.1)	531 (13.2)	107 (2.7)	331 (8.2)	248 (6.2)	171 (4.2)	121 (3.0)	64 (1.6)	50 (1.2)	68 (1.7)	4,029 (100.0)	813	4,842	5.32	1.42
総計 (%)	1,133 (2.9)	1,574 (4.0)	2,849 (7.3)	4,565 (11.7)	5,712 (14.7)	6,134 (15.8)	5,299 (13.6)	950 (2.4)	3,244 (8.3)	2,806 (7.2)	1,775 (4.6)	1,104 (2.8)	651 (1.7)	423 (1.1)	682 (1.8)	38,901 (100.0)	1,045	39,946	5.36	1.43
平均	147.33	148.22	150.36	149.95	150.46	150.21	150.62	148.93	151.35	152.06	153.10	152.42	154.04	154.62	155.55	150.72	142.49	150.67		
標準偏差	26.69	24.58	25.41	24.64	24.52	24.61	24.40	24.68	24.94	25.46	25.79	26.49	26.83	24.26	27.98	25.03	25.76	25.04		

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査