

表 3485 リン濃度(mg/dL) 性別（腹膜透析患者）

性別	3未満	3.0～	3.5～	4.0～	4.5～	5.0～	5.5～	6.0～	6.1～	6.5～	7.0～	7.5～	8.0～	8.5～	9.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性 (%)	78 (2.0)	162 (4.2)	344 (9.0)	472 (12.4)	566 (14.8)	599 (15.7)	536 (14.0)	81 (2.1)	312 (8.2)	276 (7.2)	145 (3.8)	106 (2.8)	46 (1.2)	26 (0.7)	66 (1.7)	3,815 (100.0)	1,927	5,742	5.29	1.38
女性 (%)	48 (2.2)	108 (5.0)	181 (8.4)	298 (13.8)	355 (16.5)	349 (16.2)	303 (14.0)	57 (2.6)	165 (7.6)	123 (5.7)	67 (3.1)	43 (2.0)	25 (1.2)	12 (0.6)	23 (1.1)	2,157 (100.0)	1,042	3,199	5.16	1.29
合計 (%)	126 (2.1)	270 (4.5)	525 (8.8)	770 (12.9)	921 (15.4)	948 (15.9)	839 (14.0)	138 (2.3)	477 (8.0)	399 (6.7)	212 (3.5)	149 (2.5)	71 (1.2)	38 (0.6)	89 (1.5)	5,972 (100.0)	2,969	8,941	5.25	1.35
記載なし (%)																				
総計 (%)	126 (2.1)	270 (4.5)	525 (8.8)	770 (12.9)	921 (15.4)	948 (15.9)	839 (14.0)	138 (2.3)	477 (8.0)	399 (6.7)	212 (3.5)	149 (2.5)	71 (1.2)	38 (0.6)	89 (1.5)	5,972 (100.0)	2,969	8,941	5.25	1.35

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査