

表 3488 リン濃度(mg/dL) 原疾患別（腹膜透析患者）

原疾患	3未満	3.0～	3.5～	4.0～	4.5～	5.0～	5.5～	6.0～	6.1～	6.5～	7.0～	7.5～	8.0～	8.5～	9.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
慢性糸球体腎炎 (%)	41 (2.0)	71 (3.4)	169 (8.1)	244 (11.7)	332 (15.9)	346 (16.6)	291 (14.0)	49 (2.4)	174 (8.4)	158 (7.6)	81 (3.9)	56 (2.7)	26 (1.2)	12 (0.6)	32 (1.5)	2,082 (100.0)	977	3,059	5.32	1.33
慢性腎盂腎炎 (%)	3 (4.4)	2 (2.9)	4 (5.9)	9 (13.2)	11 (16.2)	10 (14.7)	9 (13.2)	3 (4.4)	6 (8.8)	6 (8.8)	1 (1.5)	2 (2.9)			2 (2.9)	68 (100.0)	25	93	5.28	1.40
急速進行性糸球体腎炎 (%)	1 (2.0)	4 (8.2)	2 (4.1)	7 (14.3)	8 (16.3)	8 (16.3)	10 (20.4)	1 (2.0)	3 (6.1)	2 (4.1)	1 (2.0)	1 (2.0)			1 (2.0)	49 (100.0)	25	74	5.16	1.24
妊娠腎/妊娠中毒症 (%)	1 (4.0)		2 (8.0)	4 (16.0)	6 (24.0)	4 (16.0)	5 (20.0)			1 (4.0)	1 (4.0)				1 (4.0)	25 (100.0)	7	32	5.16	1.67
その他の分類不能の腎炎 (%)		4 (6.8)	5 (8.5)	8 (13.6)	8 (13.6)	14 (23.7)	8 (13.6)		4 (6.8)	4 (6.8)	3 (5.1)			1 (1.7)		59 (100.0)	26	85	5.11	1.14
多発性嚢胞腎 (%)	1 (0.6)	5 (3.2)	11 (7.1)	15 (9.6)	20 (12.8)	26 (16.7)	25 (16.0)	2 (1.3)	19 (12.2)	14 (9.0)	7 (4.5)	3 (1.9)	3 (1.9)	2 (1.3)	3 (1.9)	156 (100.0)	87	243	5.56	1.43
腎硬化症 (%)	13 (1.8)	45 (6.1)	85 (11.6)	106 (14.5)	126 (17.2)	112 (15.3)	90 (12.3)	18 (2.5)	56 (7.6)	33 (4.5)	24 (3.3)	11 (1.5)	3 (0.4)	4 (0.5)	7 (1.0)	733 (100.0)	350	1,083	5.03	1.23
悪性高血圧 (%)	1 (1.4)	2 (2.9)	5 (7.2)	12 (17.4)	12 (17.4)	8 (11.6)	8 (11.6)	1 (1.4)	2 (2.9)	4 (5.8)	5 (7.2)	6 (8.7)	1 (1.4)		2 (2.9)	69 (100.0)	38	107	5.42	1.48
糖尿病性腎症 (%)	43 (2.4)	78 (4.3)	162 (9.0)	241 (13.4)	264 (14.7)	292 (16.2)	253 (14.0)	45 (2.5)	145 (8.1)	105 (5.8)	63 (3.5)	50 (2.8)	26 (1.4)	11 (0.6)	23 (1.3)	1,801 (100.0)	965	2,766	5.22	1.35
SLE腎炎 (%)		5 (11.4)	5 (11.4)	5 (11.4)	4 (9.1)	6 (13.6)	5 (11.4)	2 (4.5)	2 (4.5)	4 (9.1)	1 (2.3)	2 (4.5)	2 (4.5)		1 (2.3)	44 (100.0)	18	62	5.35	1.58
アミロイド腎 (%)	1 (25.0)			1 (25.0)	1 (25.0)					1 (25.0)						4 (100.0)	5	9	4.72	1.42
痛風腎 (%)	1 (4.0)	1 (4.0)	1 (20.0)	5 (24.0)	6 (4.0)	1 (8.0)	2 (4.0)	1 (4.0)	3 (12.0)	3 (12.0)	1 (4.0)				1 (4.0)	25 (100.0)	8	33	5.44	1.72
先天性代謝異常 による腎不全 (%)	2 (14.3)		3 (21.4)	1 (7.1)	1 (7.1)	1 (7.1)	3 (21.4)				3 (21.4)					14 (100.0)	4	18	4.76	1.48
腎・尿路結核 (%)			1 (100.0)													1 (100.0)		1	3.50	
腎・尿路結石 (%)	1 (10.0)			1 (10.0)	2 (20.0)	3 (30.0)	1 (10.0)	1 (10.0)				1 (10.0)				10 (100.0)	6	16	5.12	1.32
腎・尿路腫瘍 (%)			1 (11.1)	1 (11.1)		4 (44.4)	1 (11.1)		1 (11.1)				1 (11.1)			9 (100.0)	5	14	5.49	1.22
閉塞性尿路障害 (%)		1 (6.3)	2 (12.5)	2 (12.5)	1 (6.3)	2 (12.5)	1 (6.3)	1 (6.3)	2 (12.5)	4 (25.0)						16 (100.0)	6	22	5.31	1.19
骨髄腫 (%)	1 (20.0)				2 (40.0)	1 (20.0)	1 (20.0)									5 (100.0)	3	8	4.56	1.31
腎形成不全 (%)		2 (3.6)	2 (3.6)	9 (16.4)	6 (10.9)	9 (16.4)	9 (16.4)	2 (3.6)	3 (5.5)	5 (9.1)	4 (7.3)		2 (3.6)	1 (1.8)	1 (1.8)	55 (100.0)	21	76	5.61	1.42
不明 (%)	13 (2.4)	36 (6.6)	49 (9.0)	81 (14.8)	82 (15.0)	79 (14.5)	81 (14.8)	6 (1.1)	40 (7.3)	41 (7.5)	9 (1.6)	11 (2.0)	6 (1.1)	5 (0.9)	7 (1.3)	546 (100.0)	294	840	5.14	1.36
再導入 (%)		1 (2.8)			5 (13.9)	6 (16.7)	13 (36.1)	1 (2.8)	3 (8.3)	2 (5.6)	1 (2.8)	2 (5.6)		1 (2.8)	1 (2.8)	36 (100.0)	15	51	5.85	1.20
その他 (%)	5 (3.0)	12 (7.3)	16 (9.7)	18 (10.9)	24 (14.5)	16 (9.7)	23 (13.9)	5 (3.0)	14 (8.5)	9 (5.5)	10 (6.1)	4 (2.4)	1 (0.6)	1 (0.6)	7 (4.2)	165 (100.0)	84	249	5.32	1.63
合計 (%)	126 (2.1)	270 (4.5)	525 (8.8)	770 (12.9)	921 (15.4)	948 (15.9)	839 (14.0)	138 (2.3)	477 (8.0)	399 (6.7)	212 (3.5)	149 (2.5)	71 (1.2)	38 (0.6)	89 (1.5)	5,972 (100.0)	2,969	8,941	5.25	1.35
記載なし (%)																				
総計 (%)	126 (2.1)	270 (4.5)	525 (8.8)	770 (12.9)	921 (15.4)	948 (15.9)	839 (14.0)	138 (2.3)	477 (8.0)	399 (6.7)	212 (3.5)	149 (2.5)	71 (1.2)	38 (0.6)	89 (1.5)	5,972 (100.0)	2,969	8,941	5.25	1.35

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査