

表 3490 リン濃度(mg/dL) 体重(kg)別（腹膜透析患者）

体重	3未満	3.0～	3.5～	4.0～	4.5～	5.0～	5.5～	6.0～	6.1～	6.5～	7.0～	7.5～	8.0～	8.5～	9.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)		3 (7.9)	2 (5.3)	7 (18.4)	2 (5.3)	5 (13.2)	3 (7.9)	2 (5.3)	4 (10.5)	6 (15.8)	3 (7.9)			1 (2.6)		38 (100.0)		38	5.41	1.33
20～ (%)		2 (8.7)	1 (4.3)	4 (17.4)	4 (17.4)	4 (17.4)	3 (13.0)		1 (4.3)	1 (4.3)		1 (4.3)			2 (8.7)	23 (100.0)		23	5.53	2.20
30～ (%)	8 (4.8)	14 (8.4)	22 (13.2)	26 (15.6)	27 (16.2)	23 (13.8)	22 (13.2)	2 (1.2)	11 (6.6)	2 (1.2)	5 (3.0)	4 (2.4)			1 (0.6)	167 (100.0)	5	172	4.78	1.30
40～ (%)	26 (3.0)	47 (5.4)	83 (9.5)	132 (15.1)	147 (16.8)	149 (17.1)	118 (13.5)	23 (2.6)	53 (6.1)	37 (4.2)	21 (2.4)	14 (1.6)	11 (1.3)	6 (0.7)	6 (0.7)	873 (100.0)	31	904	5.02	1.26
50～ (%)	35 (2.3)	79 (5.1)	141 (9.2)	218 (14.2)	245 (15.9)	257 (16.7)	229 (14.9)	26 (1.7)	105 (6.8)	95 (6.2)	46 (3.0)	27 (1.8)	13 (0.8)	5 (0.3)	16 (1.0)	1,537 (100.0)	54	1,591	5.12	1.27
60～ (%)	24 (1.5)	59 (3.8)	129 (8.2)	206 (13.1)	243 (15.5)	249 (15.9)	214 (13.6)	36 (2.3)	128 (8.2)	111 (7.1)	66 (4.2)	41 (2.6)	28 (1.8)	10 (0.6)	25 (1.6)	1,569 (100.0)	47	1,616	5.32	1.34
70～ (%)	10 (1.3)	18 (2.3)	58 (7.4)	80 (10.2)	124 (15.8)	117 (14.9)	110 (14.0)	25 (3.2)	87 (11.1)	65 (8.3)	36 (4.6)	25 (3.2)	9 (1.1)	6 (0.8)	13 (1.7)	783 (100.0)	28	811	5.48	1.31
80～ (%)	2 (0.7)	7 (2.5)	19 (6.7)	19 (6.7)	38 (13.3)	38 (13.3)	46 (16.1)	10 (3.5)	26 (9.1)	32 (11.2)	15 (5.3)	15 (5.3)	2 (0.7)	5 (1.8)	11 (3.9)	285 (100.0)	13	298	5.79	1.55
90～ (%)	2 (2.0)	1 (1.0)	7 (7.0)	6 (6.0)	12 (12.0)	9 (9.0)	14 (14.0)	4 (4.0)	16 (16.0)	12 (12.0)	5 (5.0)	3 (3.0)	3 (3.0)		6 (6.0)	100 (100.0)	4	104	5.86	1.55
100～ (%)	1 (5.6)				2 (11.1)	4 (22.2)	1 (5.6)	1 (5.6)	3 (16.7)	1 (5.6)		3 (16.7)	1 (5.6)		1 (5.6)	18 (100.0)	2	20	6.24	1.70
110～ (%)			1 (11.1)	1 (11.1)	1 (11.1)	1 (11.1)	1 (11.1)			2 (22.2)		1 (11.1)		1 (11.1)		9 (100.0)	1	10	5.91	1.70
120～ (%)			1 (11.1)	2 (22.2)		1 (11.1)	2 (22.2)		1 (11.1)					1 (11.1)	1 (11.1)	9 (100.0)		9	6.04	2.29
合計 (%)	108 (2.0)	230 (4.3)	464 (8.6)	701 (13.0)	845 (15.6)	857 (15.8)	763 (14.1)	129 (2.4)	435 (8.0)	364 (6.7)	197 (3.6)	134 (2.5)	67 (1.2)	35 (0.6)	82 (1.5)	5,411 (100.0)	185	5,596	5.26	1.35
記載なし (%)	18 (3.2)	40 (7.1)	61 (10.9)	69 (12.3)	76 (13.5)	91 (16.2)	76 (13.5)	9 (1.6)	42 (7.5)	35 (6.2)	15 (2.7)	15 (2.7)	4 (0.7)	3 (0.5)	7 (1.2)	561 (100.0)	2,784	3,345	5.09	1.36
総計 (%)	126 (2.1)	270 (4.5)	525 (8.8)	770 (12.9)	921 (15.4)	948 (15.9)	839 (14.0)	138 (2.3)	477 (8.0)	399 (6.7)	212 (3.5)	149 (2.5)	71 (1.2)	38 (0.6)	89 (1.5)	5,972 (100.0)	2,969	8,941	5.25	1.35
平均	57.26	55.92	59.31	58.46	60.01	59.87	61.10	62.55	63.44	63.74	63.29	65.81	63.57	66.60	67.14	60.70	62.12	60.74		
標準偏差	13.29	12.42	13.45	13.65	12.94	13.02	13.71	14.94	14.59	14.70	14.10	15.05	13.42	19.62	17.37	13.90	13.81	13.90		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査