

表 3492 リン濃度(mg/dL) PTH値(pg/mL)別（腹膜透析患者）PTH測定法:whole-PTH

PTH値	3未満	3.0～	3.5～	4.0～	4.5～	5.0～	5.5～	6.0～	6.1～	6.5～	7.0～	7.5～	8.0～	8.5～	9.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)	3 (7.7)	1 (2.6)	6 (15.4)	7 (17.9)	8 (20.5)	6 (15.4)	3 (7.7)		4 (10.3)		1 (2.6)					39 (100.0)	1	40	4.66	1.09
20～ (%)		4 (8.9)	4 (8.9)	3 (6.7)	11 (24.4)	9 (20.0)	2 (4.4)	1 (2.2)	2 (4.4)	6 (13.3)	2 (4.4)	1 (2.2)				45 (100.0)		45	5.11	1.19
35～ (%)	1 (1.8)	3 (5.5)	5 (9.1)	8 (14.5)	7 (12.7)	8 (14.5)	11 (20.0)	2 (3.6)	5 (9.1)	1 (1.8)	2 (3.6)	1 (1.8)	1 (1.8)			55 (100.0)		55	5.11	1.19
50～ (%)	1 (1.3)	2 (2.7)	13 (17.3)	18 (24.0)	14 (18.7)	10 (13.3)	11 (14.7)		1 (1.3)	3 (4.0)	1 (1.3)	1 (1.3)				75 (100.0)	2	77	4.72	0.97
75～ (%)	1 (1.4)	4 (5.8)	10 (14.5)	12 (17.4)	16 (23.2)	5 (7.2)	10 (14.5)	2 (2.9)	3 (4.3)	5 (7.2)		1 (1.4)				69 (100.0)		69	4.83	1.03
100～ (%)	2 (2.9)	4 (5.7)	5 (7.1)	15 (21.4)	10 (14.3)	7 (10.0)	10 (14.3)	3 (4.3)	4 (5.7)	3 (4.3)	5 (7.1)		1 (1.4)	1 (1.4)		70 (100.0)	1	71	5.07	1.26
125～ (%)	2 (4.4)	3 (6.7)	3 (6.7)	7 (15.6)	5 (11.1)	8 (17.8)	10 (22.2)		3 (6.7)	1 (2.2)	3 (6.7)					45 (100.0)		45	5.00	1.17
150～ (%)					1 (100.0)											1 (100.0)		1	4.60	
151～ (%)		1 (2.4)	4 (9.5)	6 (14.3)	6 (14.3)	11 (26.2)	6 (14.3)		2 (4.8)	3 (7.1)	1 (2.4)	1 (2.4)	1 (2.4)			42 (100.0)	1	43	5.21	1.08
180～ (%)			3 (8.8)	4 (11.8)	6 (17.6)	6 (17.6)	3 (8.8)	1 (2.9)	5 (14.7)	3 (8.8)	1 (2.9)	1 (2.9)		1 (2.9)		34 (100.0)		34	5.46	1.16
210～ (%)	1 (3.7)		2 (7.4)	2 (7.4)	5 (18.5)	8 (29.6)	2 (7.4)	1 (3.7)	2 (7.4)	2 (7.4)	1 (3.7)		1 (3.7)			27 (100.0)		27	5.23	1.15
240～ (%)				2 (9.1)	6 (27.3)	4 (18.2)	7 (31.8)		1 (4.5)		1 (4.5)	1 (4.5)				22 (100.0)	1	23	5.39	0.85
300～ (%)		1 (5.3)			5 (26.3)	6 (31.6)	4 (21.1)		2 (10.5)		1 (5.3)					19 (100.0)		19	5.27	0.85
350～ (%)			1 (12.5)		2 (25.0)	1 (12.5)	1 (12.5)	1 (12.5)		1 (12.5)					1 (12.5)	8 (100.0)		8	6.07	2.39
400～ (%)			1 (9.1)	3 (27.3)		1 (9.1)		1 (9.1)	2 (18.2)	2 (18.2)					1 (9.1)	11 (100.0)		11	5.70	1.72
500～ (%)		1 (9.1)	1 (9.1)		4 (36.4)	2 (18.2)		1 (9.1)	1 (9.1)					1 (9.1)		11 (100.0)		11	5.14	1.50
合計 (%)	11 (1.9)	24 (4.2)	58 (10.1)	87 (15.2)	106 (18.5)	92 (16.1)	80 (14.0)	13 (2.3)	37 (6.5)	30 (5.2)	19 (3.3)	7 (1.2)	4 (0.7)	3 (0.5)	2 (0.3)	573 (100.0)	6	579	5.05	1.17
記載なし (%)		3 (18.8)		1 (6.3)	4 (25.0)	2 (12.5)	1 (6.3)		3 (18.8)	1 (6.3)		1 (6.3)				16 (100.0)	124	140	5.01	1.28
総計 (%)	11 (1.9)	27 (4.6)	58 (9.8)	88 (14.9)	110 (18.7)	94 (16.0)	81 (13.8)	13 (2.2)	40 (6.8)	31 (5.3)	19 (3.2)	8 (1.4)	4 (0.7)	3 (0.5)	2 (0.3)	589 (100.0)	130	719	5.05	1.17
平均	85.00	120.25	105.28	107.32	145.38	144.35	125.54	222.08	154.81	135.13	122.84	114.00	135.50	294.00	418.00	132.74	115.33	132.56		
標準偏差	66.58	159.73	97.98	87.04	169.66	119.48	87.57	273.32	141.82	116.33	83.46	81.98	78.93	266.60	84.85	129.77	91.71	129.39		

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査