

表 3497 リン濃度(mg/dL) 収縮期血圧(mmHg)別（腹膜透析患者）

収縮期血圧	3未満	3.0～	3.5～	4.0～	4.5～	5.0～	5.5～	6.0～	6.1～	6.5～	7.0～	7.5～	8.0～	8.5～	9.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
60未満 （％）												1 (100.0)				1 (100.0)		1	7.70	
60～ （％）	1 (7.7)			4 (30.8)	2 (15.4)	1 (7.7)	3 (23.1)			2 (15.4)						13 (100.0)		13	4.90	1.12
80～ （％）	7 (5.8)	13 (10.8)	12 (10.0)	30 (25.0)	19 (15.8)	7 (5.8)	12 (10.0)	3 (2.5)	2 (1.7)	3 (2.5)	2 (1.7)	6 (5.0)	1 (0.8)	1 (0.8)	2 (1.7)	120 (100.0)	4	124	4.77	1.58
100～ （％）	13 (2.1)	36 (5.8)	58 (9.3)	89 (14.2)	109 (17.4)	113 (18.1)	79 (12.6)	12 (1.9)	48 (7.7)	40 (6.4)	8 (1.3)	7 (1.1)	5 (0.8)	1 (0.2)	8 (1.3)	626 (100.0)	15	641	5.06	1.30
120～ （％）	32 (2.2)	65 (4.4)	144 (9.7)	200 (13.5)	248 (16.8)	225 (15.2)	213 (14.4)	42 (2.8)	98 (6.6)	97 (6.6)	52 (3.5)	23 (1.6)	16 (1.1)	6 (0.4)	16 (1.1)	1,477 (100.0)	39	1,516	5.15	1.27
140～ （％）	23 (1.5)	61 (4.0)	124 (8.1)	180 (11.7)	218 (14.2)	281 (18.2)	229 (14.9)	42 (2.7)	135 (8.8)	106 (6.9)	57 (3.7)	35 (2.3)	18 (1.2)	10 (0.6)	21 (1.4)	1,540 (100.0)	39	1,579	5.32	1.29
160～ （％）	12 (1.7)	18 (2.5)	51 (7.2)	77 (10.8)	88 (12.4)	111 (15.6)	95 (13.4)	12 (1.7)	78 (11.0)	60 (8.5)	52 (7.3)	27 (3.8)	8 (1.1)	6 (0.8)	15 (2.1)	710 (100.0)	11	721	5.55	1.41
180～ （％）	3 (1.4)	7 (3.3)	7 (3.3)	18 (8.5)	34 (16.0)	28 (13.1)	29 (13.6)	6 (2.8)	17 (8.0)	20 (9.4)	11 (5.2)	12 (5.6)	8 (3.8)	3 (1.4)	10 (4.7)	213 (100.0)	4	217	5.79	1.55
200～ （％）			3 (10.0)	3 (10.0)	1 (3.3)	4 (13.3)	5 (16.7)	1 (3.3)	2 (6.7)	5 (16.7)	1 (3.3)	3 (10.0)	1 (3.3)		1 (3.3)	30 (100.0)	1	31	5.93	1.53
220～ （％）				1 (10.0)		2 (20.0)	1 (10.0)		3 (30.0)		1 (10.0)		1 (10.0)	1 (10.0)		10 (100.0)		10	6.35	1.39
合計 （％）	91 (1.9)	200 (4.2)	399 (8.4)	602 (12.7)	719 (15.2)	772 (16.3)	666 (14.1)	118 (2.5)	383 (8.1)	333 (7.0)	184 (3.9)	114 (2.4)	58 (1.2)	28 (0.6)	73 (1.5)	4,740 (100.0)	113	4,853	5.28	1.34
記載なし （％）	35 (2.8)	70 (5.7)	126 (10.2)	168 (13.6)	202 (16.4)	176 (14.3)	173 (14.0)	20 (1.6)	94 (7.6)	66 (5.4)	28 (2.3)	35 (2.8)	13 (1.1)	10 (0.8)	16 (1.3)	1,232 (100.0)	2,856	4,088	5.12	1.36
総計 （％）	126 (2.1)	270 (4.5)	525 (8.8)	770 (12.9)	921 (15.4)	948 (15.9)	839 (14.0)	138 (2.3)	477 (8.0)	399 (6.7)	212 (3.5)	149 (2.5)	71 (1.2)	38 (0.6)	89 (1.5)	5,972 (100.0)	2,969	8,941	5.25	1.35
平均	134.37	135.19	138.09	137.04	138.66	141.59	141.61	140.76	145.25	144.04	149.08	149.84	148.50	152.07	149.48	141.07	138.39	141.01		
標準偏差	25.02	22.90	20.85	23.36	22.05	21.59	22.02	21.59	22.92	23.47	21.72	27.36	27.52	27.71	26.54	22.91	21.52	22.88		

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する％です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査