

表 3503 PTH値(pg/mL) 性別（透析患者全体）PTH測定法:intact-PTH

| 性別          | 20未満            | 20～             | 40～             | 60～             | 80～             | 100～            | 120～            | 140～            | 160～            | 180～             | 240～         | 241～            | 300～            | 360～           | 420～           | 480～         | 500～           | 540～           | 600～           | 800～           | 合計                 | 記載なし  | 総計      | 平均     | 標準偏差   |
|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|-------|---------|--------|--------|
| 男性<br>(%)   | 7,194<br>(4.7)  | 10,604<br>(6.9) | 11,350<br>(7.4) | 12,184<br>(7.9) | 12,565<br>(8.2) | 12,305<br>(8.0) | 11,914<br>(7.7) | 11,005<br>(7.1) | 9,938<br>(6.5)  | 22,675<br>(14.7) | 295<br>(0.2) | 12,942<br>(8.4) | 7,380<br>(4.8)  | 4,131<br>(2.7) | 2,354<br>(1.5) | 582<br>(0.4) | 889<br>(0.6)   | 978<br>(0.6)   | 1,549<br>(1.0) | 1,103<br>(0.7) | 153,937<br>(100.0) | 4,190 | 158,127 | 169.30 | 152.93 |
| 女性<br>(%)   | 4,679<br>(5.4)  | 6,342<br>(7.3)  | 6,666<br>(7.6)  | 7,046<br>(8.1)  | 7,048<br>(8.1)  | 6,853<br>(7.9)  | 6,308<br>(7.2)  | 5,802<br>(6.7)  | 5,235<br>(6.0)  | 11,838<br>(13.6) | 149<br>(0.2) | 6,897<br>(7.9)  | 4,146<br>(4.8)  | 2,553<br>(2.9) | 1,571<br>(1.8) | 382<br>(0.4) | 675<br>(0.8)   | 736<br>(0.8)   | 1,250<br>(1.4) | 1,059<br>(1.2) | 87,235<br>(100.0)  | 2,194 | 89,429  | 177.25 | 181.65 |
| 合計<br>(%)   | 11,873<br>(4.9) | 16,946<br>(7.0) | 18,016<br>(7.5) | 19,230<br>(8.0) | 19,613<br>(8.1) | 19,158<br>(7.9) | 18,222<br>(7.6) | 16,807<br>(7.0) | 15,173<br>(6.3) | 34,513<br>(14.3) | 444<br>(0.2) | 19,839<br>(8.2) | 11,526<br>(4.8) | 6,684<br>(2.8) | 3,925<br>(1.6) | 964<br>(0.4) | 1,564<br>(0.6) | 1,714<br>(0.7) | 2,799<br>(1.2) | 2,162<br>(0.9) | 241,172<br>(100.0) | 6,384 | 247,556 | 172.17 | 163.94 |
| 記載なし<br>(%) |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |              |                 |                 |                |                |              |                |                |                |                |                    |       |         |        |        |
| 総計<br>(%)   | 11,873<br>(4.9) | 16,946<br>(7.0) | 18,016<br>(7.5) | 19,230<br>(8.0) | 19,613<br>(8.1) | 19,158<br>(7.9) | 18,222<br>(7.6) | 16,807<br>(7.0) | 15,173<br>(6.3) | 34,513<br>(14.3) | 444<br>(0.2) | 19,839<br>(8.2) | 11,526<br>(4.8) | 6,684<br>(2.8) | 3,925<br>(1.6) | 964<br>(0.4) | 1,564<br>(0.6) | 1,714<br>(0.7) | 2,799<br>(1.2) | 2,162<br>(0.9) | 241,172<br>(100.0) | 6,384 | 247,556 | 172.17 | 163.94 |

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。  
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy  
2014年調査