

表 3529 PTH値(pg/mL) 性別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）PTH測定法:intact-PTH

性別	20未満	20～	40～	60～	80～	100～	120～	140～	160～	180～	240～	241～	300～	360～	420～	480～	500～	540～	600～	800～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	966	1,333	1,524	1,621	1,801	1,773	1,660	1,501	1,382	3,242	54	1,932	1,076	645	330	89	138	154	260	191	21,672	454	22,126	176.16	162.64
(%)	(4.5)	(6.2)	(7.0)	(7.5)	(8.3)	(8.2)	(7.7)	(6.9)	(6.4)	(15.0)	(0.2)	(8.9)	(5.0)	(3.0)	(1.5)	(0.4)	(0.6)	(0.7)	(1.2)	(0.9)	(100.0)				
女性	717	862	913	971	1,045	1,022	921	822	768	1,763	23	1,023	638	397	261	57	99	98	163	159	12,722	280	13,002	179.13	180.47
(%)	(5.6)	(6.8)	(7.2)	(7.6)	(8.2)	(8.0)	(7.2)	(6.5)	(6.0)	(13.9)	(0.2)	(8.0)	(5.0)	(3.1)	(2.1)	(0.4)	(0.8)	(0.8)	(1.3)	(1.2)	(100.0)				
合計	1,683	2,195	2,437	2,592	2,846	2,795	2,581	2,323	2,150	5,005	77	2,955	1,714	1,042	591	146	237	252	423	350	34,394	734	35,128	177.26	169.45
(%)	(4.9)	(6.4)	(7.1)	(7.5)	(8.3)	(8.1)	(7.5)	(6.8)	(6.3)	(14.6)	(0.2)	(8.6)	(5.0)	(3.0)	(1.7)	(0.4)	(0.7)	(0.7)	(1.2)	(1.0)	(100.0)				
記載なし																									
(%)																									
総計	1,683	2,195	2,437	2,592	2,846	2,795	2,581	2,323	2,150	5,005	77	2,955	1,714	1,042	591	146	237	252	423	350	34,394	734	35,128	177.26	169.45
(%)	(4.9)	(6.4)	(7.1)	(7.5)	(8.3)	(8.1)	(7.5)	(6.8)	(6.3)	(14.6)	(0.2)	(8.6)	(5.0)	(3.0)	(1.7)	(0.4)	(0.7)	(0.7)	(1.2)	(1.0)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査