

表 3539 PTH値(pg/mL) 透析前収縮期血圧(mmHg)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）PTH測定法:intact-PTH

透析前収縮期血圧	20未満	20～	40～	60～	80～	100～	120～	140～	160～	180～	240～	241～	300～	360～	420～	480～	500～	540～	600～	800～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
60未満 (%)						1 (50.0)				1 (50.0)											2 (100.0)		2	153.50	51.62
60～ (%)	6 (6.3)	3 (3.2)	5 (5.3)	9 (9.5)	9 (9.5)	7 (7.4)	7 (7.4)	6 (6.3)	2 (2.1)	13 (13.7)		8 (8.4)	7 (7.4)	3 (3.2)	3 (3.2)		2 (2.1)		3 (3.2)	2 (2.1)	95 (100.0)	4	99	207.75	200.84
80～ (%)	42 (8.0)	30 (5.7)	50 (9.5)	51 (9.7)	51 (9.7)	39 (7.4)	33 (6.3)	22 (4.2)	25 (4.8)	79 (15.0)	1 (0.2)	35 (6.7)	20 (3.8)	20 (3.8)	7 (1.3)	2 (0.4)	2 (0.4)	4 (0.8)	4 (0.8)	8 (1.5)	525 (100.0)	18	543	173.89	255.67
100～ (%)	151 (6.2)	184 (7.5)	171 (7.0)	186 (7.6)	206 (8.4)	182 (7.4)	181 (7.4)	154 (6.3)	158 (6.4)	343 (14.0)	2 (0.1)	205 (8.4)	86 (3.5)	73 (3.0)	50 (2.0)	15 (0.6)	24 (1.0)	17 (0.7)	40 (1.6)	22 (0.9)	2,450 (100.0)	55	2,505	173.77	164.26
120～ (%)	333 (4.9)	456 (6.8)	481 (7.1)	494 (7.3)	537 (8.0)	528 (7.8)	517 (7.7)	461 (6.8)	404 (6.0)	958 (14.2)	16 (0.2)	593 (8.8)	342 (5.1)	227 (3.4)	123 (1.8)	31 (0.5)	50 (0.7)	49 (0.7)	86 (1.3)	57 (0.8)	6,743 (100.0)	122	6,865	177.55	168.92
140～ (%)	477 (4.7)	611 (6.0)	741 (7.3)	748 (7.3)	846 (8.3)	850 (8.3)	776 (7.6)	720 (7.1)	665 (6.5)	1,519 (14.9)	22 (0.2)	903 (8.9)	481 (4.7)	286 (2.8)	157 (1.5)	35 (0.3)	68 (0.7)	66 (0.6)	108 (1.1)	111 (1.1)	10,190 (100.0)	149	10,339	175.80	167.55
160～ (%)	355 (4.8)	443 (6.0)	539 (7.3)	591 (8.0)	605 (8.2)	646 (8.7)	562 (7.6)	497 (6.7)	475 (6.4)	1,067 (14.4)	12 (0.2)	615 (8.3)	372 (5.0)	228 (3.1)	119 (1.6)	27 (0.4)	37 (0.5)	56 (0.8)	86 (1.2)	68 (0.9)	7,400 (100.0)	109	7,509	174.45	165.64
180～ (%)	115 (4.1)	189 (6.7)	184 (6.6)	220 (7.8)	233 (8.3)	222 (7.9)	214 (7.6)	176 (6.3)	179 (6.4)	407 (14.5)	7 (0.2)	233 (8.3)	165 (5.9)	90 (3.2)	50 (1.8)	19 (0.7)	20 (0.7)	23 (0.8)	40 (1.4)	23 (0.8)	2,809 (100.0)	41	2,850	180.23	157.97
200～ (%)	29 (4.0)	51 (7.0)	52 (7.2)	54 (7.4)	63 (8.7)	56 (7.7)	50 (6.9)	51 (7.0)	46 (6.3)	101 (13.9)		73 (10.1)	40 (5.5)	17 (2.3)	13 (1.8)	1 (0.1)	8 (1.1)	7 (1.0)	7 (1.0)	6 (0.8)	725 (100.0)	8	733	176.63	153.09
220～ (%)	6 (3.1)	17 (8.9)	15 (7.8)	22 (11.5)	14 (7.3)	18 (9.4)	13 (6.8)	11 (5.7)	7 (3.6)	22 (11.5)	1 (0.5)	17 (8.9)	7 (3.6)	5 (2.6)	4 (2.1)	2 (1.0)	2 (1.0)	1 (0.5)	1 (0.5)	7 (3.6)	192 (100.0)	7	199	194.22	234.78
合計 (%)	1,514 (4.9)	1,984 (6.4)	2,238 (7.2)	2,375 (7.6)	2,564 (8.2)	2,549 (8.2)	2,353 (7.6)	2,098 (6.7)	1,961 (6.3)	4,510 (14.5)	61 (0.2)	2,682 (8.6)	1,520 (4.9)	949 (3.0)	526 (1.7)	132 (0.4)	213 (0.7)	223 (0.7)	375 (1.2)	304 (1.0)	31,131 (100.0)	513	31,644	176.29	168.45
記載なし (%)	169 (5.2)	211 (6.5)	199 (6.1)	217 (6.7)	282 (8.6)	246 (7.5)	228 (7.0)	225 (6.9)	189 (5.8)	495 (15.2)	16 (0.5)	273 (8.4)	194 (5.9)	93 (2.9)	65 (2.0)	14 (0.4)	24 (0.7)	29 (0.9)	48 (1.5)	46 (1.4)	3,263 (100.0)	221	3,484	186.43	178.48
総計 (%)	1,683 (4.9)	2,195 (6.4)	2,437 (7.1)	2,592 (7.5)	2,846 (8.3)	2,795 (8.1)	2,581 (7.5)	2,323 (6.8)	2,150 (6.3)	5,005 (14.6)	77 (0.2)	2,955 (8.6)	1,714 (5.0)	1,042 (3.0)	591 (1.7)	146 (0.4)	237 (0.7)	252 (0.7)	423 (1.2)	350 (1.0)	34,394 (100.0)	734	35,128	177.26	169.45
平均	148.27	150.64	150.32	151.33	150.55	151.61	150.73	150.94	151.14	150.74	152.57	151.12	152.63	150.35	149.75	151.41	149.57	152.40	149.69	151.54	150.82	146.79	150.76		
標準偏差	25.44	25.45	24.89	25.71	25.52	24.60	24.36	23.91	24.16	24.62	23.52	24.75	24.69	25.20	26.50	28.30	27.00	24.74	25.56	26.97	24.94	27.50	24.98		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する％です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査