

表 3548 PTH値(pg/mL) ヘモグロビン濃度(g/dL)別（腹膜透析患者）PTH測定法:intact-PTH

ヘモグロビン 濃度	20未満	20～	40～	60～	80～	100～	120～	140～	160～	180～	240～	241～	300～	360～	420～	480～	500～	540～	600～	800～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
5未満 (%)						1 (14.3)	1 (14.3)	1 (14.3)	1 (14.3)	2 (28.6)		1 (14.3)									7 (100.0)		7	183.14	57.44
5～ (%)		1 (9.1)			1 (9.1)	2 (18.2)			1 (9.1)	3 (27.3)		3 (27.3)			1 (9.1)				1 (9.1)		11 (100.0)	1	12	227.36	167.32
6～ (%)		3 (18.8)		1 (6.3)		1 (6.3)	1 (6.3)	2 (12.5)	1 (6.3)	2 (12.5)		3 (18.8)		1 (6.3)						1 (6.3)	16 (100.0)	3	19	219.06	231.94
7～ (%)	4 (4.3)	4 (4.3)	4 (4.3)	9 (9.6)	2 (2.1)	7 (7.4)	5 (5.3)	5 (5.3)	3 (3.2)	17 (18.1)		8 (8.5)	6 (6.4)	5 (5.3)	5 (5.3)			2 (2.1)	6 (6.4)	2 (2.1)	2 (100.0)	4	98	245.87	211.80
8～ (%)	3 (1.2)	13 (5.3)	12 (4.9)	8 (3.3)	14 (5.8)	18 (7.4)	13 (5.3)	12 (4.9)	18 (7.4)	27 (11.1)	1 (0.4)	26 (10.7)	20 (8.2)	16 (6.6)	9 (3.7)	2 (0.8)	8 (3.3)	3 (1.2)	10 (4.1)	10 (4.1)	243 (100.0)	25	268	291.65	375.28
9～ (%)	17 (2.6)	41 (6.2)	44 (6.6)	39 (5.9)	54 (8.2)	48 (7.3)	53 (8.0)	36 (5.4)	40 (6.0)	71 (10.7)	1 (0.2)	51 (7.7)	43 (6.5)	28 (4.2)	19 (2.9)	9 (1.4)	12 (1.8)	11 (1.7)	22 (3.3)	23 (3.5)	662 (100.0)	28	690	235.86	245.06
10～ (%)	33 (2.5)	75 (5.6)	74 (5.6)	96 (7.2)	94 (7.1)	77 (5.8)	80 (6.0)	99 (7.5)	78 (5.9)	201 (15.1)	3 (0.2)	124 (9.3)	95 (7.2)	59 (4.4)	40 (3.0)	10 (0.8)	13 (1.0)	23 (1.7)	25 (1.9)	29 (2.2)	1,328 (100.0)	45	1,373	222.39	231.49
11～ (%)	33 (2.5)	79 (5.9)	73 (5.5)	94 (7.1)	82 (6.2)	96 (7.2)	94 (7.1)	79 (5.9)	74 (5.6)	202 (15.2)	2 (0.2)	122 (9.2)	109 (8.2)	53 (4.0)	36 (2.7)	13 (1.0)	11 (0.8)	21 (1.6)	27 (2.0)	28 (2.1)	1,328 (100.0)	51	1,379	217.97	206.50
12～ (%)	25 (4.1)	45 (7.3)	42 (6.8)	48 (7.8)	37 (6.0)	49 (8.0)	36 (5.9)	37 (6.0)	35 (5.7)	93 (15.1)	1 (0.2)	60 (9.8)	38 (6.2)	21 (3.4)	14 (2.3)	6 (1.0)	3 (0.5)	7 (1.1)	9 (1.5)	8 (1.3)	614 (100.0)	26	640	191.47	169.10
13～ (%)	4 (2.2)	10 (5.5)	16 (8.8)	8 (4.4)	15 (8.2)	11 (6.0)	13 (7.1)	9 (4.9)	16 (8.8)	16 (8.8)	1 (0.5)	22 (12.1)	6 (3.3)	8 (4.4)	9 (4.9)		5 (2.7)	3 (1.6)	3 (1.6)	7 (3.8)	182 (100.0)	6	188	241.41	257.50
14～ (%)	3 (4.5)	6 (9.1)	2 (3.0)	7 (10.6)	4 (6.1)	3 (4.5)	3 (4.5)	5 (7.6)	5 (7.6)	5 (7.6)	1 (1.5)	2 (3.0)	7 (10.6)	5 (7.6)	2 (3.0)	2 (3.0)	1 (1.5)	1 (1.5)	1 (1.5)	1 (1.5)	66 (100.0)	1	67	210.98	177.37
合計	122 (2.7)	277 (6.1)	267 (5.9)	310 (6.8)	303 (6.7)	313 (6.9)	299 (6.6)	285 (6.3)	272 (6.0)	637 (14.0)	10 (0.2)	422 (9.3)	324 (7.1)	196 (4.3)	135 (3.0)	42 (0.9)	53 (1.2)	71 (1.6)	104 (2.3)	109 (2.4)	4,551 (100.0)	190	4,741	223.61	229.84
記載なし (%)	1 (1.3)	4 (5.2)	1 (1.3)	5 (6.5)	6 (7.8)	3 (3.9)	6 (7.8)		4 (5.2)	17 (22.1)		9 (11.7)	7 (9.1)	4 (5.2)	4 (5.2)	1 (1.3)	1 (1.3)	2 (2.6)	1 (1.3)	1 (1.3)	77 (100.0)	186	263	239.88	196.06
総計	123 (2.7)	281 (6.1)	268 (5.8)	315 (6.8)	309 (6.7)	316 (6.8)	305 (6.6)	285 (6.2)	276 (6.0)	654 (14.1)	10 (0.2)	431 (9.3)	331 (7.2)	200 (4.3)	139 (3.0)	43 (0.9)	54 (1.2)	73 (1.6)	105 (2.3)	110 (2.4)	4,628 (100.0)	376	5,004	223.88	229.31
平均	11.00	10.91	10.94	10.93	10.89	10.78	10.83	10.86	10.85	10.84	11.06	10.83	10.88	10.81	10.75	10.95	10.62	10.79	10.40	10.58	10.84	10.53	10.83		
標準偏差	1.36	1.45	1.34	1.32	1.31	1.55	1.34	1.40	1.48	1.33	1.68	1.49	1.37	1.45	1.52	1.37	1.58	1.30	1.50	1.42	1.41	1.61	1.42		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査