

表 3552 PTH値(pg/mL) 収縮期血圧(mmHg)別（腹膜透析患者）PTH測定法:intact-PTH

収縮期血圧	20未満	20～	40～	60～	80～	100～	120～	140～	160～	180～	240～	241～	300～	360～	420～	480～	500～	540～	600～	800～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
60未満 (%)						1 (100.0)															1 (100.0)		1	117.00	
60～ (%)		1 (10.0)		1 (10.0)	2 (20.0)			1 (10.0)		2 (20.0)				1 (10.0)	1 (10.0)	1 (10.0)					10 (100.0)	1	11	216.90	163.15
80～ (%)	7 (6.9)	8 (7.8)	6 (5.9)	7 (6.9)	10 (9.8)	3 (2.9)	6 (5.9)	5 (4.9)	5 (4.9)	15 (14.7)	2 (2.0)	9 (8.8)	5 (4.9)	3 (2.9)	2 (2.0)	1 (1.0)			1 (1.0)	7 (6.9)	102 (100.0)	2	104	260.59	454.57
100～ (%)	19 (3.9)	37 (7.6)	26 (5.4)	37 (7.6)	27 (5.6)	32 (6.6)	28 (5.8)	29 (6.0)	27 (5.6)	70 (14.5)	1 (0.2)	43 (8.9)	30 (6.2)	21 (4.3)	19 (3.9)	1 (0.2)	7 (1.4)	4 (0.8)	14 (2.9)	12 (2.5)	484 (100.0)	16	500	223.45	231.77
120～ (%)	22 (1.8)	61 (5.1)	81 (6.8)	82 (6.9)	82 (6.9)	83 (7.0)	77 (6.5)	76 (6.4)	85 (7.1)	162 (13.6)	2 (0.2)	108 (9.1)	96 (8.0)	59 (4.9)	29 (2.4)	7 (0.6)	12 (1.0)	18 (1.5)	23 (1.9)	28 (2.3)	1,193 (100.0)	44	1,237	218.69	201.54
140～ (%)	29 (2.4)	71 (5.9)	59 (4.9)	79 (6.6)	71 (5.9)	94 (7.8)	94 (7.8)	69 (5.7)	75 (6.2)	186 (15.4)	2 (0.2)	118 (9.8)	90 (7.5)	49 (4.1)	27 (2.2)	12 (1.0)	9 (0.7)	26 (2.2)	21 (1.7)	24 (2.0)	1,205 (100.0)	45	1,250	222.55	246.65
160～ (%)	16 (2.9)	39 (7.0)	32 (5.7)	42 (7.5)	49 (8.7)	35 (6.2)	29 (5.2)	36 (6.4)	27 (4.8)	82 (14.6)	1 (0.2)	51 (9.1)	40 (7.1)	17 (3.0)	17 (3.0)	8 (1.4)	6 (1.1)	8 (1.4)	18 (3.2)	8 (1.4)	561 (100.0)	13	574	211.29	187.12
180～ (%)	4 (2.5)	8 (5.0)	13 (8.1)	8 (5.0)	15 (9.3)	10 (6.2)	9 (5.6)	7 (4.3)	8 (5.0)	15 (9.3)	1 (0.6)	15 (9.3)	11 (6.8)	8 (5.0)	7 (4.3)	5 (3.1)	2 (1.2)	2 (1.2)	5 (3.1)	8 (5.0)	161 (100.0)	7	168	253.62	240.77
200～ (%)		2 (8.3)	1 (4.2)	3 (12.5)	3 (12.5)	1 (4.2)	1 (4.2)	1 (4.2)		2 (8.3)		2 (8.3)	1 (4.2)	2 (8.3)	2 (8.3)		1 (4.2)	1 (4.2)		1 (4.2)	24 (100.0)	2	26	283.58	364.78
220～ (%)					1 (14.3)	3 (42.9)						2 (28.6)	1 (14.3)								7 (100.0)		7	181.29	99.89
合計 (%)	97 (2.6)	227 (6.1)	218 (5.8)	259 (6.9)	260 (6.9)	262 (7.0)	244 (6.5)	224 (6.0)	227 (6.1)	534 (14.2)	9 (0.2)	348 (9.3)	274 (7.3)	160 (4.3)	104 (2.8)	35 (0.9)	37 (1.0)	59 (1.6)	82 (2.2)	88 (2.3)	3,748 (100.0)	130	3,878	222.39	231.74
記載なし (%)	26 (3.0)	54 (6.1)	50 (5.7)	56 (6.4)	49 (5.6)	54 (6.1)	61 (6.9)	61 (6.9)	49 (5.6)	120 (13.6)	1 (0.1)	83 (9.4)	57 (6.5)	40 (4.5)	35 (4.0)	8 (0.9)	17 (1.9)	14 (1.6)	23 (2.6)	22 (2.5)	880 (100.0)	246	1,126	230.19	218.66
総計 (%)	123 (2.7)	281 (6.1)	268 (5.8)	315 (6.8)	309 (6.7)	316 (6.8)	305 (6.6)	285 (6.2)	276 (6.0)	654 (14.1)	10 (0.2)	431 (9.3)	331 (7.2)	200 (4.3)	139 (3.0)	43 (0.9)	54 (1.2)	73 (1.6)	105 (2.3)	110 (2.4)	4,628 (100.0)	376	5,004	223.88	229.31
平均	138.20	139.19	140.81	140.17	142.40	141.92	140.41	140.47	139.84	140.08	136.11	141.86	141.49	139.80	142.01	150.66	143.08	144.12	142.48	139.55	140.88	140.79	140.88		
標準偏差	25.57	23.93	22.63	22.96	25.88	22.71	21.03	21.76	20.80	21.76	34.61	22.63	20.92	23.85	25.82	25.91	24.89	18.83	22.51	26.79	22.84	22.84	22.83		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査