

表 3555 PTH値(pg/mL) 治療方法別（透析患者全体）PTH測定法:whole-PTH

治療方法	20未満	20～	35～	50～	75～	100～	125～	150～	151～	180～	210～	240～	300～	350～	400～	500～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
施設血液透析 （%）	1,561 (9.4)	1,944 (11.7)	1,678 (10.1)	2,585 (15.6)	2,253 (13.6)	1,865 (11.2)	1,241 (7.5)	41 (0.2)	991 (6.0)	693 (4.2)	493 (3.0)	552 (3.3)	216 (1.3)	141 (0.8)	159 (1.0)	186 (1.1)	16,599 (100.0)	482	17,081	106.45	113.69
血液透析濾過 （%）	263 (8.7)	321 (10.6)	286 (9.4)	460 (15.1)	408 (13.4)	343 (11.3)	241 (7.9)	4 (0.1)	222 (7.3)	145 (4.8)	101 (3.3)	94 (3.1)	47 (1.5)	30 (1.0)	27 (0.9)	48 (1.6)	3,040 (100.0)	33	3,073	112.51	112.51
血液濾過 （%）		1 (50.0)								1 (50.0)							2 (100.0)		2	114.00	115.97
血液吸着透析 （%）	26 (18.2)	16 (11.2)	16 (11.2)	24 (16.8)	16 (11.2)	14 (9.8)	9 (6.3)	2 (1.4)	5 (3.5)	2 (1.4)	4 (2.8)	3 (2.1)	1 (0.7)		4 (2.8)	1 (0.7)	143 (100.0)	1	144	91.77	103.33
在宅血液透析 （%）	4 (9.3)	4 (9.3)	8 (18.6)	7 (16.3)	2 (4.7)	5 (11.6)	3 (7.0)		2 (4.7)		3 (7.0)	2 (4.7)	1 (2.3)		1 (2.3)	1 (2.3)	43 (100.0)	1	44	113.42	112.66
腹膜透析 （%）	40 (6.9)	45 (7.8)	55 (9.5)	77 (13.3)	69 (11.9)	71 (12.3)	45 (7.8)	1 (0.2)	43 (7.4)	34 (5.9)	27 (4.7)	23 (4.0)	19 (3.3)	8 (1.4)	11 (1.9)	11 (1.9)	579 (100.0)	140	719	132.56	129.39
合計 （%）	1,894 (9.3)	2,331 (11.4)	2,043 (10.0)	3,153 (15.5)	2,748 (13.5)	2,298 (11.3)	1,539 (7.5)	48 (0.2)	1,263 (6.2)	875 (4.3)	628 (3.1)	674 (3.3)	284 (1.4)	179 (0.9)	202 (1.0)	247 (1.2)	20,406 (100.0)	657	21,063	108.01	114.01
記載なし （%）																					
総計 （%）	1,894 (9.3)	2,331 (11.4)	2,043 (10.0)	3,153 (15.5)	2,748 (13.5)	2,298 (11.3)	1,539 (7.5)	48 (0.2)	1,263 (6.2)	875 (4.3)	628 (3.1)	674 (3.3)	284 (1.4)	179 (0.9)	202 (1.0)	247 (1.2)	20,406 (100.0)	657	21,063	108.01	114.01

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査